

شناسایی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ با استفاده از روش‌های مولکولی

الهام قاضی زاده^۱، امیر موسوی^{۱*}، فرانک هادی^۲ و هاله هاشمی سهی^۱

^۱ تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهی

^۲ خرم‌آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۵ تاریخ پذیرش: ۹۳/۸/۱۴

چکیده

با توجه به افزایش سطح محصولات دست ورزی شده ژنتیکی، شناسایی و تعیین سطح کمی آنها با روش‌های مطمئن و حساس ضروری می‌باشد. در ایران بخش عمده سویای مصرفی، وارداتی و از نوع تراریخت می‌باشد. در این مطالعه از روش‌های مولکولی جهت شناسایی کیفی و کمی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ در سطوح مختلف شامل تعیین نوع تراژن بکار رفته، سازه-های ژنی و رخداد اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از چندین جفت آغازگر مربوط به عناصر تراژن، آنالیزهای مولکولی غربال‌گری در سطح کیفی انجام گردید. در ادامه، آنالیزهای نیمه کمی برای سری رقت‌های مختلفی از DNA به دست آمده از این بذور تراریخت با همان جفت آغازگرها نسبت به قطعه تکثیر یافته با آغازگرهای ژن کنترل اختصاصی سویا (لکتین) نیز انجام شد. بدین ترتیب، میزان حد آستانه مختلفی برای شناسایی این عناصر به دست آمد به طوری که در سنجش مبتنی بر توالی پیش بر 35S نسبت به ژن خانه دار لکتین، میزان ۱ درصد و در سنجش مبتنی بر توالیهای پایان دهنده NOS و *cp4 epsps* نسبت به ژن خانه دار لکتین میزان ۰/۵ درصد و در نهایت در سنجش مبتنی بر توالیهای سازه ژنی (CTP-35S) و رخداد اختصاصی سویا (pDNA-35S)، میزان ۵ درصد را نشان داد. به طور کلی، حساسیت آزمون نیمه کمی برای توالیهای پایان دهنده NOS و *cp4 epsps* با استفاده از روش زنجیره ای پلی مرز معمولی بیشتر از سایر عناصر بوده است. بنابراین این روش می‌تواند جهت شناسایی و غربال‌گری سریع نمونه‌ها و محموله‌های حاوی سویای تراریخت مقاوم به رانداپ به کار رود.

واژه‌های کلیدی: گیاهان دست ورزی شده ژنتیکی، سویای مقاوم به رانداپ، حد آستانه تشخیص، رخداد، *epsps*

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۲۱۴۴۷۸۷۳۶۸، پست الکترونیکی: m-amir@nigeb.ac.ir

مقدمه

بلافاصله بعد از تولید آنها آغاز شد و در سال ۲۰۱۲ سطح زیر کشت این گیاهان ۱۷۰ میلیون هکتار در جهان گزارش گردیده است. ۵۹ درصد این مساحت یعنی حدود ۱۰۰ میلیون هکتار مربوط به گیاهان دارای صفت مقاومت به علف‌کش است. پس از آن صفت مقاومت توأم به علف‌کش و آفات و صفت مقاومت به آفات به تنهایی در اولویت قرار دارند. (۱۰) البته چیزی کمتر از یک درصد نیز، سایر صفات تراریختی را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر، بسیاری از بذور گیاهان و مشتقات

امروزه تولید گیاهان تراریخت از عمده ترین کاربردهای زیست فناوری در کشاورزی می‌باشد. در حال حاضر، انتقال ژن از طریق مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراریخت در مواردی همچون مقاومت به آفات، علف‌کشها، بیماریها، بهبود کیفیت محصولات و تولید مواد دارویی با سرعت زیادی رو به افزایش است. سطح زیر کشت این قبیل گیاهان در جهان طی سالهای اخیر با روند تصاعدی افزایش یافته، به طوری که کشت گیاهان تراریخت با سطح زیر کشت در حدود ۱/۷ میلیون هکتار در سال ۱۹۹۶

این محصول و مشتقات غذایی حاصل از آن در مبادی ورودی از مهم‌ترین مراحل کسب مجوزهای واردات آن به شمار می‌رود. در این بررسی در نظر است روشهای شناسایی کیفی و کمی بذور تراریخت سویا معرفی شده و محدوده حضور آنها در توده‌های بذر عادی تعیین شود (۳ و ۵). به دلیل وجود حساسیت زیاد در آنالیز نتایج، چندین روش استخراج DNA مورد مقایسه قرار گرفته، همچنین به منظور بررسی حضور عناصر تراژن، از آنالیزهای غربالگری براساس شناسایی توالیهای کنترل کننده بیان ژن و روشهای غربالگری اختصاصی استفاده به عمل آمده است. این آنالیزها در سه سطح شامل تعیین نوع تراژن به کار رفته، سازه‌های ژنی و رخداد اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ انجام گردیده است. همچنین برای اولین بار، به منظور شناسایی دقیق و سریع سویای مقاوم به رانداپ، تشخیص کیفی عناصر تراژن به طور همزمان در سطح رخداد، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی‌مرز دو و سه گانه انجام گردیده است. در نهایت، به منظور تعیین حد آستانه مجاز در بذور تراریخت، سنجش نیمه کمی برای تمامی عناصر تراژن انجام گردید که می‌تواند به عنوان پروتکل مناسب و استاندارد برای کلیه نمونه‌ها به کار گرفته شود.

مواد و روشها

مواد گیاهی: بذور گیاه سویا (*Glycine max L.*) تراریخت مقاوم به رانداپ از یک نمونه محموله بذر وارداتی توسط شرکت ژن آزما پرشیا و نمونه‌های تیپ وحشی از مرکز تحقیقات دانه‌های روغنی تهیه گردید.

روش استخراج DNA ژنومی: در این مرحله جهت به دست آوردن DNA الگو با کیفیت و کمیت مناسب از بافت بذری سویا، سه روش مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

تراریخت آنها، در بازارهای جهانی وجود دارند. انتظار می‌رود که زیست فناوری و مهندسی ژنتیک نقش عمده ای را از نظر امنیت غذایی در ۳۰ سال آینده داشته باشد (۲) تا به امروز اثر منفی قابل توجهی از مشتقات غذایی تراریخت مورد تأیید قرار گرفته بر روی سلامت انسانی و حیوانات تغذیه کننده از آنها (به جز تاثیر احتمالی آلرژیکی تعداد محدودی از پروتئینهای آفت کش) اعلام نشده است (۶ و ۷). با این وجود، برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست و همچنین به دلیل اهمیت سلامت روانی مصرف کنندگان و دادن حق انتخاب به آنها برای استفاده از این محصولات، دولت‌ها قوانینی را در جهت نظارت بر روی تولید و جابه جایی بذور تراریخت و استفاده از آنها در فرآورده‌ها و مشتقات غذایی وضع کرده اند. به این منظور پروتوکلی تحت عنوان "کارتاهنا" تصویب گردیده است که در آن اثرات احتمالی رها سازی موجودات دست ورزی شده ژنتیکی (GMOs) در جامعه، بر سلامت انسانی و مصرف کنندگان مطرح شده است. لذا، بر طبق این پروتکل و برای کنترل دقیق تر بر نحوه جابجایی محصولات GM در دراز مدت، و به منظور کنترل در تولید و مصرف بذور و مشتقات تراریخت و همچنین برای رعایت حقوق مصرف کنندگان برای اطلاع از تراریختی مواد غذایی موجود در بازار، کمیسیون استاندارد اروپا، تمامی زیرواحدهای اروپایی را وادار به برچسب دار کردن محصولات حاوی مقادیر بالاتر از ۰/۹ درصد از DNA تراژن کرده‌اند (۱۱). هر چند برچسب دار کردن محصولات تراژن در این حد توسط بسیاری از کشورها اختیاری بوده است، اما اکثر کشورهای مصرف کننده و تولید کننده محصولات تراریخت آزمایشات جامع و حساسی را در زمینه تشخیص کیفی و کمی درصد عناصر تراژن در تبعیت از این قوانین انجام می‌دهند (۲ و ۸).

عمده ترین صفت تراریخت، مقاومت به علف‌کش گلايفوسیت بوده که در این بین سویای مقاوم به رانداپ جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. شناسایی دقیق

مراحل کار همانند روش ارائه شده انجام گردید. ۳- استخراج با استفاده از کیت DNA ژنومی Bioneer (Daejeon, Korea): استخراج DNA با استفاده از این کیت طبق دستورالعمل ارائه شده انجام گردید. در تمامی این روشها، کیفیت و کمیت DNA استخراج شده به وسیله الکتروفورز بر روی ژل آگارز و اندازه گیری چگالی نوری از طریق روش اسپکتروفتومتری (اندازه گیری شدت جذب در طول موج و به دست آوردن نسبت OD_{260}/OD_{280})، مورد ارزیابی قرار گرفت.

۱- روش Wizard بهینه شده: استخراج DNA با استفاده از روش معمول (۹) که تأیید شده از طرف سازمان استاندارد جهانی است، انجام گردید، با این تفاوت که در بافر TNE، BME یک درصد اضافه می‌شود و بقیه مراحل کار همانند پروتکل اجرایی می‌باشد. ۲- روش بهینه شده CTAB: استخراج DNA با استفاده از روش ارائه شده توسط Jankiewicz و همکاران (۱۱) که مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی می‌باشد، انجام شد، با این تفاوت که در بافر CTAB، BME یک درصد اضافه می‌شود و بقیه

جدول ۱- مشخصات آغازگرهای استفاده شده در سنجش کیفی و نیمه کمی سویای تراریخت

نام آغازگر	اختصاصیت	توالی (5'→3')	اندازه محصول تکثیر یافته	منبع
35S1-35S2	پیش بر 35S	GCTCCTACAATGCCATCAGATAGTGGGAT TGTGTCGTC	۱۹۵	۷
NOS1-NOS3	پایان دهنده NOS	GAATCCTGTTGCCGGTCTTGTATCCTA GTTTGC GCGCTA	۱۸۰	۷
GMO1-GMO2	ژن لکتین	GCCCTTACTCCACCCCATCCGCCCATC TGCAAAGCCTCTACA	۴۴۷	۱۱
RR01-RR02	35S-cp4 epsps	CCTTCGCAAGACCTTCTCTATATGGCT GCCATGGCCTGCATG	۵۰۷	۱۲
RR04-RR05	CTP-cp4 epsps	CCCCAAGTCTTAAATCTCAAGTTCGGG GCCGGCTGCTTGCA	۱۸۵	۱۲
Exp CP4 epsps	cp4 epsps ₁	TGGCAAAAATTCACTGGCA	۷۲۰	در این مقاله، مطالعه شده است
de CP4 EXP	cp4 epsps ₂	CATTGAGCTTCTTCCGA	۵۰۶	در این مقاله، مطالعه شده است
pDNA-35S	رخداد	CATGCGTATTCCTATCTCA	۱۱۶	در این مقاله، مطالعه شده است
p35S-CTP	p35S و توالی سیگنال پپتید ژن epsps اختصاصی	CATTACGGCAATTCGCTTAC	۲۳۵	در این مقاله، مطالعه شده است

مختلف بذور تراریخت و تیپ وحشی را تأیید می‌نماید. برای این منظور، جفت آغازگرهای GMO1 و GMO2 برای جداسازی بخش خارجی ژن لکتین (قطعه ۴۴۷ جفت باز) به کار گرفته شد. در مرحله بعد، به منظور انجام روش غربالگری برای این بذور، از جفت آغازگرهای 35S1 و 35S2 (مربوط به پیش بر CaMV 35S) برای تکثیر قطعه ۱۹۵ جفت بازی و آغازگرهای NOS1 و NOS3 (مربوط به پایان دهنده NOS) برای جدا کردن قطعه حدود ۱۸۰

شناسایی کیفی مواد تراریخت: الف) واکنش زنجیره ای پلی‌مراز با آغازگرهای اختصاصی: برای سنجش کیفی و کمی سویای رانداپ ردی، جفت آغازگرهای ارائه شده در جدول ۱ انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. برای تشخیص صحیح حضور سویای تراریخت، در ابتدا می‌بایستی تکثیر ژن خانه دار لکتین (مربوط به سویا) بهینه سازی گردد. واکنش زنجیره ای پلی‌مراز برای ژن خانه دار لکتین، یکسان بودن تقریبی غلظت DNA در درصدهای

دهنده ای که برای هر واکنش زنجیره ای پلی‌مراز به کار رفته است شامل 1X بافر PCR، ۱/۵ میلی‌مولار $MgCl_2$ ، ۲ میلی‌مولار dNTP، ۰/۵ واحد *Taq polymerase*، ۰/۵ پیکومول از هر آغازگر به همراه ۲۰ نانوگرم از DNA استخراج شده، در حجم نهایی ۲۰ میکرولیتر بوده است. شرایط دمایی مورد استفاده در واکنش‌های زنجیره ای پلی-مراز در جدول ۲ خلاصه شده است.

جدول ۲- شرایط واکنش زنجیره ای پلی‌مراز در سنجش کیفی و نیمه کمی سویای تراریخت

آغازگر	زمان واکنش	دمای اتصال (درجه سانتی‌گراد)	تعداد چرخه
35S1-35S2	۳۰ ثانیه	۵۴	۳۵
NOS1-NOS3	۳۰ ثانیه	۵۶	۳۵
GMO3-GMO4	۳۰ ثانیه	۵۸	۳۵
RR01-RR02	۱ دقیقه	۶۰	۳۵
RR04-RR05	۱ دقیقه	۶۰	۳۵
<i>cp4 epsps₁</i>	۳۰ ثانیه	۵۸/۶	۴۰
<i>cp4 epsps₂</i>	۳۰ ثانیه	۵۷	۴۰
pDNA-35S	۱ دقیقه	۶۵	۳۵
p35S-CTP	۳۰ ثانیه	۶۰	۳۵

گردید و برای واکنش تکثیر سه گانه، از جفت آغازگرهای pDNA-35S + CaMV 35S + GMO1-2 با دمای اتصال ۵۶ درجه استفاده به عمل آمد. محصولات واکنش برای بررسی بر روی ژل آگارز ۲ درصد الکتروفورز شد. در ادامه برای تأیید دقیق تر، محصول PCR حاصل از توالی پیش بر CaMV 35S، با آنزیم محدودالتر *EcoRV* مورد برش قرار گرفت. نتیجه واکنش حاصل از برش آنزیمی روی ژل آگارز یک درصد الکتروفورز گردید و حضور قطعه مورد انتظار تأیید شد.

ارزیابی نیمه کمی مواد تراریخت: در این مرحله، یک سری رقت‌های مختلف از سویای مقاوم به رانداپ (۱۰۰ تا ۰/۱ درصد) از طریق مخلوط کردن نمودن نمونه های تراریخت با سویای تیپ وحشی تهیه شد. این رقت ها به ترتیب شامل ۱۰۰ درصد پودر سویای تراریخت، مخلوطهای ۵۰ درصد پودر سویای تراریخت و ۵۰ درصد

جفت بازی استفاده گردید (۴، ۱۰، و ۱۳). پس از آن، برای تشخیص تراریختی بذور سویا در سطح اختصاصی تراژن، از جفت آغازگر *Cp4 epsps* (۴) و در سطح اختصاصی سازه، از جفت آغازگر RR01 و RRO2 (۵ و ۱۳) و همچنین جهت شناسایی نوع رخداد (GTS 40-3-2)، از جفت آغازگر (pDNA-35S) برای بخشی از ژنوم گیاه سویا و قسمتی از پیش بر 35S استفاده گردید. اجزا واکنش


(ب) واکنش زنجیره ای پلی‌مراز داخلی (Nested PCR): برای انجام واکنش زنجیره ای پلی‌مراز داخلی، از جفت آغازگر RRO4 و RRO5 استفاده گردید. محصول واکنش RR01 و RRO2 به نسبت ۱۰ برابر رقیق شده و از آن به عنوان الگو طبق شرایط دمایی و اجزا واکنش ارائه شده در بالا استفاده گردید. با این تفاوت که در مورد اخیر، تعداد چرخه ها، ۲۵ دور می باشد. پس از آن، حدود ۵ میکرولیتر از محصول واکنش دوم بر روی ژل آگارز ۲ درصد، الکتروفورز گردید.

(ج) واکنش زنجیره ای پلی‌مراز چند گانه : در این مرحله واکنش‌های تکثیر دو گانه برای جفت آغازگر های GMO1-2 + pDNA-35S با دمای اتصال ۶۲ درجه سانتی‌گراد، جفت آغازگرهای GMO1-GMO2 + CaMV 35S با دمای بهینه اتصال ۵۶ درجه و جفت آغازگرهای CaMV 35S + pDNA-35S با دمای بهینه اتصال ۵۵/۸ درجه انجام

NOS1 و NOS3)، ژن *cp4 epsps*، سازه ژنی p35S-CTP و توالیهای بخشی از تراژن و ژنوم میزبان (pDNA-35S) نسبت به ژن خانه‌دار لکتین انجام گردید. شرایط بگونه ای در نظر گرفته شد که به طور همزمان در یک دستگاه ترموسیکلر و در دو ویال مجزا، واکنشهای زنجیره ای پلی‌مراز ژن خانه‌دار و عناصر مذکور انجام شد.

پودر سویای تیپ وحشی، ۲۵ درصد پودر سویای تراریخت و ۷۵ درصد پودر سویای تیپ وحشی، ۵ درصد پودر سویای تراریخت و ۹۵ درصد پودر سویای تیپ وحشی، ۱ درصد پودر سویای تراریخت و ۹۹ درصد پودر سویای تیپ وحشی بودند. پس از استخراج DNA، سنجش کمی نمونه‌ها برای توالیهای پیش بر 35S (آغازگرهای 35S1 و 35S2)، توالی پایان دهنده NOS (آغازگرهای

M 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b M 1c 2c 3c 4c 5c 6c M



شکل ۱- مقایسه الگوی الکتروفورزی DNA ژنومیک استخراج شده با روشهای CTAB و Wizard بهینه شده و کیت Bioneer بر روی ژل آگارز ۱ درصد که به ترتیب با حروف a، b و c نشان داده شده اند. چاهکهای ۱-۵: به ترتیب DNA ژنومی به دست آمده از نمونه‌های ۱، ۵، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد تراریخت؛ چاهک ۶: سویای تیپ وحشی؛ M: نشانگر وزن مولکولی (Fermentas) 100 bp ladder.


نتایج

روش استفاده شود. در مقایسه، نسبت جذبی محاسبه شده برای DNA استخراج شده با روش CTAB، در حدود ۱/۹ تا ۲ بود که برای تکثیر تمامی توالیها در این مطالعه مناسب و قابل استفاده می‌باشد. استخراج DNA بر اساس کیت Bioneer نسبت به دو روش قبل خلوص بهتر ولی مقدار کمتری از DNA استخراج شده را نشان داد (شکل ۱).

تشخیص کیفی: سنجش کیفی برای توالیهای پیش بر 35S و توالی لکتین (ژن خانه دار سویا)، *cp4epsps* (ژن اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ) و سازه ژنی p35S-CTP و پایان دهنده NOS به وسیله واکنش زنجیره ای پلی‌مراز انجام و نوار مربوط به تکثیر هر قطعه از توالی هدف جدا گردید (شکل ۲). همچنین واکنش زنجیره ای پلی‌مراز داخلی با استفاده از آغازگرهای RR04 و RR05 برای تکثیر محصول حاصل از آغازگرهای RR01 و RR02 که مربوط به قسمت پیوندگاه سازه ژنی سویای مقاوم به

استخراج DNA: با توجه به اینکه انجام واکنش زنجیره ای پلی‌مراز برای سنجش کیفی و کمی وابسته به کیفیت و کمیت DNA استخراج شده می‌باشد، سه روش استخراج DNA شامل CTAB و Wizard و نیز کیت Bioneer برای رقتهای ۱/۱-۱۰۰ درصد سویای تراریخت مورد استفاده قرار گرفت و خلوص DNA استخراجی با روشهای مختلف با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تمامی نمونه‌های استخراج شده با روش CTAB دارای غلظت و کیفیت مناسبی می‌باشند. در عین حال، کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش Wizard بهینه شده بررسی و نسبت جذبی 260/280 برای تمامی نمونه‌ها محاسبه شد که بین ۱/۷ تا ۱/۹ بود. بنابراین بهتر است برای تکثیر ژنهای اختصاصی سویا با آغازگرهای GMO1- GMO2 و GMO3-GMO4 از DNA به دست آمده با این

چاهک ۲: محصول تکثیر قطعه ژن اختصاصی سویا (لکتین)؛ چاهک ۳: محصول تکثیر قطعه تراژن اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ (*cp4*) *epsps*؛ چاهک ۴: محصول تکثیر قطعه سازه ژنی اختصاصی رانداپ ردی (p35S-CTP)؛ چاهک ۵: محصول تکثیر قطعه NOS؛ چاهک ۶: محصول تکثیر واکنش زنجیره ای پلی‌مرز داخلی با آغازگرهای RR01-RR02 و RR04-RR05.




شکل ۳- تأیید محصول PCR حاصل از توالی پیش بر 35S CaMV به وسیله برش آنزیمی *EcoRV* M: نشانگر وزن مولکولی bp ladder ۱۰۰ (Fermentas)؛ C⁻: کنترل منفی (الگوی آب)، چاهک‌های +: محصولات PCR هضم شده، چاهک‌های -: محصولات PCR هضم نشده.

ارزیابی نیمه کمی: واکنش زنجیره ای پلی‌مرز برای تشخیص نیمه کمی DNA بذور با رقت های ۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۵ و ۱ درصد انجام گردید. در ابتدا، واکنش زنجیره ای پلی‌مرز برای سنجش مثبتی بر توالی پیش بر 35S نسبت به ژن خانه دار لکتین انجام گردید که نتایج، میزان ۱ درصد را به عنوان آستانه تشخیص برای این توالی نشان داد. همچنین واکنش زنجیره ای پلی‌مرز برای توالیهای پایان دهنده NOS و *cp4 epsps* نسبت به ژن خانه دار لکتین انجام گردیده که آستانه تشخیص ۵/۰ درصد برای این عناصر به دست آمد (شکل ۵ ب و ج). در نهایت، تشخیص نیمه کمی مبتنی بر توالیهای سازه ژنی CTP- (35S) و رخداد اختصاصی سویا (pDNA-35S) برای نمونه بذر سویای مقاوم به رانداپ انجام گردید که آستانه تشخیص ۵ درصد برای این عناصر به دست آمد (شکل ۵).


رانداپ است، انجام گردید. قطعات حاصل به ترتیب دارای اندازه‌های ۵۰۷ و ۱۸۵ جفت باز بودند که دقت و صحت واکنش زنجیره ای پلی‌مرز داخلی برای سازه ژنی سویای مقاوم به رانداپ را نشان می‌دادند. همچنین برای آنالیز دقیق تر عناصر تراژن در بذور سویای مقاوم به رانداپ، از واکنش زنجیره ای پلی‌مرز دوگانه برای عناصر ژن اختصاصی سویا + پیش بر (CaMV 35S -GMO1/GMO2)، ژن اختصاصی سویا + رخداد اختصاصی سویا (pDNA-35S-GMO1/GMO2)، و پیش بر 35S + رخداد اختصاصی سویا (-CaMV 35S-pDNA) استفاده به عمل آمد. همچنین، واکنش زنجیره ای پلی‌مرز سه گانه برای ژن اختصاصی سویا + رخداد اختصاصی سویا + پیش بر (35S -GMO1/GMO2-pDNA + CaMV 35S +) برای بذور ۱ درصد سویای مقاوم به رانداپ، نیز انجام شد. در کنار واکنشهای PCR، کنترل منفی (آب مقطر) و کنترل مثبت برای لکتین (ناقل پلاسمیدی pGEM TA حاوی ژن لکتین)، کنتری مثبت برای رخداد pDNA-35S (ناقل پلاسمیدی pGEM TA حاوی توالی رخداد) و کنترل مثبت برای CaMV 35S (pBI121(Clontech)) برای تأیید صحت نتایج به کار گرفته شد. بدین ترتیب با قطعات منفرد و اختصاصی برای هر سه عنصر در بذور سویای ۱ درصد تراریخت، توسط واکنش زنجیره ای پلی‌مرز چندگانه مشاهده شد (شکل ۴).



شکل ۲- الکتروفورز محصول PCR سویای مقاوم به رانداپ با آغازگرهای اختصاصی مختلف. M: نشانگر وزن مولکولی bp ladder ۱۰۰ (Fermentas)؛ چاهک ۱: محصول تکثیر قطعه 35S.



شکل ۴- الگوی الکتروفورز محصول PCR دوگانه و سه گانه. M: نشانگر وزن مولکولی ۱۰۰ bp ladder (Fermentas). چاهک ۱: کنترل مثبت 35S (pBI121)؛ چاهک ۲: کنترل مثبت رخداد pDNA-35S؛ چاهک ۳: کنترل مثبت لکتین؛ چاهک ۴: محصول تکثیر توالبهای ژن لکتین + 35S؛ چاهک ۵ محصول تکثیر توالبهای 35S + pDNA35S؛ چاهک ۶ محصول تکثیر توالبهای ژن لکتین + pDNA35S؛ چاهک ۷: محصول تکثیر توالبهای لکتین + 35S + pDNA-35S؛ C: کنترل منفی (الگوی آب).



شکل ۵- الکتروفورز محصول تکثیر نیمه کمی توالبهای اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ نسبت به ژن خانه دار لکتین. الف، تشخیص نیمه کمی ژن اختصاصی سویا (لکتین)؛ ب، تشخیص نیمه کمی مبتنی بر توالی پیش بر 35S CaM (35S1-35S2)؛ ج، تشخیص نیمه کمی مبتنی بر توالی پایان دهنده NOS (NOS1-NOS3)؛ د، تشخیص نیمه کمی مبتنی بر توالی کاست ژنی (CTP-35S)؛ ه، تشخیص نیمه کمی بر اساس توالی *cp4*؛ و، تشخیص نیمه کمی بر مبنای توالی اختصاصی رخداد (pDNA-35S)؛ M: نشانگر وزن مولکولی ۱۰۰ bp ladder (Fermentas)؛ C: کنترل منفی (الگوی آب)؛ چاهک ۱: ۱۰۰ درصد سویای تراریخت؛ چاهک ۲: ۵۰ درصد سویای تراریخت؛ چاهک ۳: ۲۵ درصد سویای تراریخت؛ چاهک ۴: ۵ درصد سویای تراریخت؛ چاهک ۵: ۱ درصد سویای تراریخت؛ چاهک ۶: ۰/۵ درصد سویای تراریخت.

بحث

(NOS1-NOS3) و توالی *cp4 epsps* ۰/۵ درصد می‌باشد. این در حالی است که آستانه تشخیص نیمه کمی برای سازه ژنی (CTP-35S) و رخداد اختصاصی سویای مقاوم به رانداپ (pDNA-35S) برای بذور سویای مقاوم به رانداپ در حدود ۵ درصد می‌باشد. واکنش زنجیره ای پلی مراز سه گانه نیمه کمی برای توالیهای ژن خانه دار اختصاصی سویا، رخداد اختصاصی سویا و پیش بر CaMV 35S با کمک آغازگرهای GMO1/GMO2، pDNA-35S و CaMV 35S برای بذور ۱ درصد سویای مقاوم به رانداپ، نیز انجام گردید. قطعات مورد انتظار برای این نمونه‌ها به دست آمد که با توجه به میزان ۵ درصد بعنوان حد آستانه تشخیص براساس توالی pDNA-35S، روش چند گانه برای شناسایی در سطح رخداد، حساسیت و اختصاصیت مناسبی را نشان داده است. لذا، این روش می‌تواند جهت غربالگری سریع نمونه‌های سویای تراریخت مقاوم به رانداپ در تمامی آزمایشگاهها و مراکز استاندارد کشور مورد استفاده قرار گیرد. در واقع برای اولین بار در سطح آزمایشگاهی، تشخیص اختصاصی یک گیاه در سطح رخداد با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز معمول، بدون استفاده از روش Real-Time PCR انجام گرفته است. همچنین از این روش می‌توان برای غربالگری سایر گیاهان تراریخت در کشور استفاده نمود (۱ و ۱۲).

سنجش نیمه کمی نشان داد که پس از بهینه سازی شرایط برای تمامی عناصر تراریخت، نتایج معتبر و مشابهی و حتی در چندین مورد بهتری نسبت به گزارشهای مشابه به دست آمده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان دهنده این مطلب است که حساسیت آزمون برای پایان دهنده NOS و *cp4 epsps* نیز نسبتاً بالا بوده است. این در حالی است که اگرچه حساسیت نتایج بر مبنای توالی رخداد (pDNA-35S) و سازه ژنی (CTP-35S) نسبت به سایر عناصر کمتر بوده، ولی اختصاصیت آنها میزان بالاتری را نشان داده است.

با توجه به اینکه چندین روش استخراج DNA برای سویای مقاوم به رانداپ به کار رفته است، نتایج حاکی از این نکته است که به منظور ارزیابی کیفی، استخراج DNA با روش Wizard و جهت ارزیابی نیمه کمی، روش CTAB مناسب تر می‌باشد. نتایج حاصل از واکنش زنجیره ای پلی-مراز، سنجش کیفی بخشهای مختلف کاست ژنی نمونه‌های ترایخت را تا حد مطلوبی نشان داده است. در این روشها برای اولین بار شناسایی رخداد خاص سویا با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز معمولی پس از طراحی آغازگر مناسب انجام شده است. این روش بهترین و مطمئن ترین روش تشخیص کیفی بذور تراریخت سویای مقاوم به رانداپ در سطح رخداد اختصاصی آن (-GTS 40 3-2) می‌باشد.

به منظور بهینه سازی مجدد روشهای کیفی و تهیه پروتکل مناسب برای تشخیص کیفی عناصر موجود در کاست ژنی سویای مقاوم به رانداپ، تأیید مجدد محصول تکثیر پیش بر 35S با استفاده از روشهای هضم آنزیمی (آنزیم *EcoRV*) (شکل ۳) و واکنش زنجیره ای پلی مراز داخلی برای کاست ژنی سویای مقاوم به رانداپ (-RR04 RR05) انجام گردید. در این مطالعه، پس از مخلوط کردن پودر نمونه سویای تیپ وحشی و تراریخت، به گونه ای که میزان درصد وزن بذر ترایخت به تدریج کم شود، تشخیص نیمه کمی نمونه‌ها با درصد وزنی تراریخت مشخص برای توالی سازه سویای تراریخت رانداپ ردی نسبت به توالی ژن خانه دار لکتین انجام گردید. پس از بهینه سازی بهترین دمای مناسب برای جفت آغازگرها، واکنش PCR برای توالی هدف و ژن کنترل به طور همزمان، در ویالهای جداگانه در یک دستگاه ترموسیکلر تحت شرایط یکسان آزمایشگاهی انجام گردید. نتایج نشان داد که میزان حد آستانه برای تشخیص نیمه کمی پیش بر 35S تقریباً ۱ درصد بوده است و برای پایان دهنده NOS

منابع

1. Barzegar A., Rahimian H., Hashemi Sohi H. 2011. Agrobacterium-mediated transformation of Minou (*Citrus sp.*) and Darabi (*Citrus grandis*) and regeneration of transgenic explants expressing β -glucuronidase (uid A) gene. Iranian Journal of Biology 24(3): 342-354
2. Bradford K.J. 2007. Seed biotechnology: translating promise into practice. Pages 130-138. In: S.W. Adkins, S. Ashmore, and S.C. Navie (eds.). Seeds: Biology, Development and Ecology CAB International, Wallingford, UK.
3. Brini F., Hanin M., Mezghani I., Berkowitz G.A., Masmoudi K. 2007. Overexpression of wheat Na⁺/H⁺ antiporter TNH1 and H⁺-pyrophosphatase TvP1 improve salt- and drought-stress tolerance in *Arabidopsis thaliana* plants. Journal of Experimental Botany. 58:301-308.
4. Chen J., Hua G., Jurat-Fuentes J L., Abdullah, MA., Adang MJ. 2007. Synergism of *Bacillus thuringiensis* toxins by a fragment of a toxin-binding cadherin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104: 13901–13906
5. Carpenter J., Gianessi L. 1999. Herbicide tolerant soybeans: why growers are adopting Roundup Ready varieties. AgBioForum - Journal of Agrobiotechnology Management & Economics. 2:65-72.
6. Cattaneo M.G., Yafuso C., Schmidt C., Huang C.Y., Rahman M., Olson C., Eilers-Kirk C., Orr B.J., Marsh S.E., Antilla L., Dutilleul P., Carriere Y. 2006. Farm-scale evaluation of the impacts of transgenic cotton on biodiversity, pesticide use, and yield, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103: 7571-7576 .
7. Daniell H., wiebe P.O., Millan. A.F. 2001. Antibiotic-free chloroplast genetic engineering-an environmentally friendly approach. Trends in Plant Science, Jun;6(6):237-9
8. Gurel F., Arican E., Gozukirmizi N., Ari S. 2011. Recent molecular tools for detecting transgenic events in genetically modified (GM) crop products. Scientific Research and Essays. 6: 5091-5099
9. Hemmer W. 1997. Foods derived from genetically modified organisms and detection methods. BATS-Report 02/1997, Agency for Biosafety Research and Assessment of Technology Impacts of the Swiss Priority Program Biotechnology of the Swiss National Science Foundation, Basel, Switzerland, from http://www.bats.ch/bat/publikationen/1997-2_gmo/gmo
10. James C. 2013. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. ISAAA Brief No. 44. ISAAA: Ithaca, NY.
11. Jankiewicz A., Broll, H., Zagon J. 1999. The official method for the detection of genetically modified soybeans (German Food Act LMBG § 35): a semi-quantitative study of sensitivity limits with glyphosate-tolerant soybeans (Roundup Ready) and insect-resistant Bt maize (Maximizer). European Food Research and Technology 209(2): 77-82.
12. Roohi L., Zamani M.R., Motallebi M. 2013. Transgenic canola plants harboring beta 1,3 glucanase (bgnI) gene from *Trichoderma virens* inhibit mycelial growth of *Sclerotinia sclerotiorum*. Iranian Journal of Biology 26(1): 28-40
13. Yamaguchi H., Sasaki K., Umetsu H., Kamada H. 2003. Two detection methods of genetically modified maize and state of it import into Japan. Food Control 14(3): 201-206

Detection of Transgenic Roundup Ready Soybean Seeds by Molecular Methods

Ghazizadeh E.¹, Mousavi A.¹, Hadi F.² and Hashemi Sohi H.¹

¹ Plant Biotechnology Dept., National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, I.R. of Iran

² Biology Dept., Faculty of Science, Lorestan University, Khoramabad, I.R. of Iran

Abstract

As genetically modified organisms (GMOs) development is now increasing, detection and determination of their quantitative threshold using reliable and sensitive methods would be necessary. The aim of this study was to introduce reliable methods for qualitative and quantitative detection of Roundup-tolerant soybean particularly at event level via molecular approaches. For primary screening, we used polymerase chain reaction with several element-specific primers for detection of different percent of transgenic and non-transgenic Roundup ready soybean seed samples. Furthermore, semi-quantitative assays were performed using the same primers in combinations with soybean lectin-specific primers. The limit of detection (LOD) obtained for CTP-35S construct and event-specific (pDNA-35S) was 5%. This index for *cp4 epsps* and NOS terminator sequences was 0.5% and for CaMV 35S promoter was 1%. Results showed that the sensitivity of analysis for NOS terminator and *cp4 epsps* sequences was more than other elements and therefore, this method could be applied for rapid screening of Roundup Ready transgenic soybean samples.

Key words: Genetically modified plants, Roundup ready (RR) soybean, Limit of detection, Event, *epsps*.