

## تولید ترکیبات فنلی در کشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (*Raphanus sativus* L.)

سعید بیضائی، اکبر صفی‌پور افشار\* و فاطمه سعید نعمت‌پور

نیشاپور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشاپور، گروه زیست‌شناسی

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۲۰ تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۲/۲۶

### چکیده

اگر باکتریوم رایزوزنز سبب ایجاد بیماری ریشه مویین در گیاهان می‌شود. ریشه‌های مویین تولید شده توسط آلودگی با این باکتری، با نرخ بالای رشد و ثبات ژنتیکی مشخص می‌شوند. ایجاد ریشه مویین ممکن است سبب تغییراتی در تولید ترکیبات ثانویه گیاه شود. ترکیبات فنلی (فلاونوئیدها، تاننها و آنتوسیانینها) از جمله متابولیت‌های هستند که جزء آنتی‌اکسیدانهای طبیعی بشمار آمده و در گیاه تربچه به مقدار فراوان حضور دارند. در این مطالعه جهت ایجاد ریشه‌های مویین، تراریختی ریزنمونه‌های برگ گیاه تربچه با استفاده از دو سویه اگر باکتریوم رایزوزنز (*GUS*), *A4* (15834) انجام شد. ریشه‌های مویین ایجاد شده با استفاده از آزمون PCR مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین میزان ترکیبات فنلی در ریشه‌های مویین مورد سنجش قرار گرفت. صحت تکثیر قطعات ۷۸۰ جفت بازی برای ژن *rolB* و ۳۲۰ جفت بازی برای ژن *GUS* در ریشه‌ها بیانگر تراریخت بودن آنها بود. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که میزان ترکیبات فنلی در ریشه‌های مویین به طور معنی‌داری نسبت به ریشه‌های عادی افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد افزایش ترکیبات فنلی در ریشه‌های مویین نتیجه ورود T-DNA اگر باکتریوم رایزوزنز و برانگیختن پاسخ دفاعی گیاه باشد.

واژه‌های کلیدی: اگر باکتریوم رایزوزنز، تراریخت، ریشه مویین، تربچه

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۵۱۱۸۶۸۸۷، پست الکترونیکی: asafshar4@gmail.com

### مقدمه

در راستای حفظ ژرم پلاسما بهره‌جست و در این راستا می‌توان با استفاده از عوامل محرک آنزیم‌های کلیدی باعث افزایش بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه مورد نظر شد. از طرف دیگر حدود ۶۰ درصد از گیاهان دارویی که در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، جهت فرآوری از ریشه‌های آنها استفاده می‌شود. پیشرفتهای اخیر در بیولوژی مولکولی، آنزیم‌شناسی و کشت بافت نشان می‌دهد که این روشها سیستم‌های با ارزشی برای تولید ترکیبات ثانویه می‌باشند (۱۱). اساس ایجاد ریشه‌های مویین تلفیح گیاه با باکتری اگر باکتریوم رایزوزنز می‌باشد، این روش در دهه گذشته به عنوان یکی از روشهای تولید انبوه ترکیبات ثانویه معرفی و مورد توجه قرار گرفته است (۲۵). فنوتیپ ریشه‌های مویین با رشد سریع، انشعابات جانبی فراوان و ثبات

گیاهان منابع بسیار مهم و ارزشمندی جهت بررسی و کشف ترکیبات جدید با اهمیت دارویی می‌باشند. متابولیت‌های ثانویه همانند داروها، افزودنیهای غذایی، رنگ دهنده‌ها، طعم دهنده‌ها، آفت کشها و... از نظر اقتصادی با اهمیت هستند. بزرگ‌ترین چالش موجود در زمینه تولید ترکیبات ثانویه این است که متابولیت‌های ثانویه در مرحله خاصی تولید می‌شوند و بعضی از ترکیبات هم چنانچه سلول تمایز نیابد سنتز نمی‌شوند. بنابراین در برخی موارد کشت سلولهای گیاهی تمایز نیافته توان بیوسنتزی فرآورده‌های ثانویه را از دست می‌دهند. با توجه به نتایج به دست آمده از کشت بافتهای تمایز یافته بیشتر پژوهشها بر کشت ریشه‌های مویین تأکید دارند (۱۰). زیرا علاوه بر تولید بهینه متابولیت‌های ثانویه می‌توان از کشت ریشه‌های مویین

ترکیبات از مسیر فنیل پروپانویید و از فنیل آلانین صورت می‌گیرد. این همان مسیر بیوسنتز کومارینها، اسیدهای فنلی و لیگنینها می‌باشد. در صد عظیمی از ترکیبات فنلی منشأ فنیل آلانین دارند و برخی منشأ تیروزین دارند. کلیدی‌ترین آنزیم این مسیر فنیل آلانین آمونیلایز است (۱۲).

تریچه (*Raphanus Sativus L.*) گیاهی یک ساله، به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر تا یک متر و دارای برگهایی با پهنک منقسم به قطعات نامنظم است. سطح برگ آن بر حسب نژادهای مختلف ممکن است کاملاً بی کرک و یا پوشیده از کرکهای خشن باشد. ریشه دارای گلوکوزیدی است که بر اثر تجزیه تحت اثر آنزیم مخصوص به اسانس و Raphanol تبدیل می‌گردد. دارای ۸۶-۹۳ درصد آب، مقدار کمی مواد قندی، مواد چرب، مواد ازته، اسید فسفریک و به مقدار جزئی از مواد نشاسته‌ای و ویتامینهای B و C است. برگ و ریشه تریچه برای درمان سرطان، عوامل ضد میکروبی و ضد ویروسی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این گونه به طور وسیعی برای درمان بیماریهای کبدی و تنفسی استفاده می‌شود. همچنین فعالیت آنتی بیوتیکی و آنتی میکروبیال عصاره ریشه این گیاه نیز گزارش شده است (۷). با توجه به اینکه تاکنون در خصوص ترکیبات فنلی ریشه‌های موپین گیاه تریچه مطالعه‌ای صورت نگرفته است، در این تحقیق القاء ریشه‌های موپین در گیاه تریچه توسط آگروباکتریوم رایزوزنز و تأثیر T-DNA آگروباکتریوم رایزوزنز بر میزان تولید ترکیبات فنلی مورد مطالعه قرار گرفت.

### مواد و روشها

بذور تریچه (شرکت Vita Sementi® Italian Seeds) با استفاده از محلول شوینده حاوی آب مقطر استریل به اضافه سدیم هیپوکلریت ۵ درصد به مدت ۱۰ دقیقه با تکان دادن و سپس توسط الکل ۷۰ درصد به مدت ۳۰ ثانیه استریل شدند. سپس ۳ مرتبه شستشوی آنها با آب مقطر استریل انجام گرفت. بذور در محیط جوانه زنی حاوی

ژنتیکی در محیط‌های کشت فاقد هورمون مشخص می‌شود. تولید انبوه ترکیبات ثانویه همراه با رشد سریع در محیط‌های کشت فاقد فیتوهورمونها و ثبات ژنتیکی سبب شده است تا ریشه‌های موپین منابع با ارزشی برای مطالعه و تولید ترکیبات ثانویه شناخته شود (۱۱ و ۲۵).

ریشه موپین نوعی بیماری گیاهی است که مشخصه آن ایجاد یک توده درهم تنیده از ریشه‌های مو مانند است. تعداد زیاد ریشه‌های کوچک مو مانند ایجاد شده در نواحی آلوده شده گیاه توسط آگروباکتریوم رایزوزنز سبب استفاده از این اصطلاح گردید (۷ و ۱۴). ریشه موپین نوعی بیماری گیاهی است که توسط یک باکتری گرم منفی خاک زی به نام آگروباکتریوم رایزوزنز ایجاد می‌شود. زمانی که باکتری وارد گیاه می‌شود، تعدادی از ژنها از پلاسמיד باکتری به گیاه منتقل شده و وارد ژنوم هسته‌ای گیاه می‌شود. حاصل این انتقال تولید ریشه موپین در نزدیکی جایگاه ورود باکتری است (۲۶). سیستم ریشه‌های موپین یک سیستم پایدار است که در محیط فاقد هورمون دارای قدرت تولید بالاست. سرعت رشد بالا، کاهش زمان کشت به نصف، نگهداری آسان و قابلیت سنتز ترکیبات شیمیایی، می‌تواند ریشه‌های موپین را به یک منبع مناسب و ادامه داری جهت تولید متابولیت‌های ثانویه تبدیل کند. ریشه‌های موپین منبع در دسترس جهت مواد دارویی، آرایشی و خوراکی هستند (۱۸).

ترکیبات فنلی شامل گروه کثیری از متابولیت‌های ثانوی است که بسیاری از ترکیبات حلقوی مثل ترکیبات فنلی، فلاونها، فلاونوئیدها، تاننها، لیگنینها و حتی اسیدهای آمینه حلقوی مانند تریپتوفان، تیروزین و پرولین را شامل می‌شوند. به طور کلی فنلها مجموعه‌ای از پلیمرهای محلول (تاننها) و منومرها (اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها) هستند. واژه اسید فنلی معمولاً به مولکول‌های ساده مشتق از بنزوئیک یا سینامیک اسیدها اشاره می‌نماید. ترکیبات فنلی نسبت به تریپتوفانها حلالیت بیشتری در آب دارند. بیوسنتز این

سپری شد. پس از این مرحله، ریزنمونه‌ها به طور مستقیم یا پس از شستشو با آنتی بیوتیک سفوتاکسیم با غلظت ۵۰۰ mg/L به محیط القاء ریشه منتقل شدند و هر دو هفته یکبار به محیط جدید مشابه واگشت شدند تا ریشه‌های مویین تمایز یابند.

**استخراج DNA و آنالیز PCR:** استخراج DNA به روش (Murray and Thompson, 1980) انجام گردید (۱۶). پس از استخراج DNA، کمیت و کیفیت آن با روش اسپکتروفتومتری (T80 PG Instruments, UK) و الکتروفورز (Mini-Protean Bio-Rad, USA) مورد بررسی قرار گرفت. طراحی آغازگر با در نظر گرفتن نکات استاندارد در طراحی آغازگر از جمله طول آغازگر، دمای اتصال، %G+C، ایجاد دایمر، تولید لوپ یا حلقه در درون هر یک از آغازگرها و  $\Delta G$  مناسب بررسی گردید. سنتز آغازگر توسط شرکت تکاپو زیست ایران انجام شد. خصوصیات آغازگرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژنهای *rolB* و *GUS* در جدول ۲ نشان داده شده است.

برای تأیید انتقال ژن و تراریختی، محصولات PCR به روی ژل آگارز بارگذاری و الکتروفورز انجام گردید و تمامی ژلهای آگارز با استفاده از دستگاه (Uvitech Gel documentation) عکس برداری شدند. جدول ۳ شرایط دمایی و زمانی PCR را نشان می‌دهد.

**سنجش ترکیبات فنلی:** جهت اندازه‌گیری ترکیبات فنلی تام از معرف Folin-Ciocalteu استفاده شد. ۰/۵ میلی لیتر از این معرف به ۰/۵ میلی لیتر عصاره استخراج شده گیاهی و استانداردهای گالیگ اسید اضافه و سپس به مخلوط حاصل ۴ میلی لیتر سدیم کربنات ۱ مولار اضافه شد. پس از ۱۵ دقیقه نگهداری در دمای محیط، جذب نمونه‌ها در طول موج ۷۵۰ نانومتر به کمک اسپکتروفتومتر خوانده شد (۱۹). نتایج به دست آمده به صورت میلی گرم معادل گالیگ اسید بر گرم وزن خشک گزارش شد.

محیط کشت MS با غلظت ۵۰ درصد و فاقد هورمونهای گیاهی، کشت شدند بذور کشت شده، در قفسه نوری، با زمان نوردهی ۱۶ h روشنایی و ۸ h تاریکی در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از رشد بذور، از برگ گیاهان جهت تراریختی استفاده شد. برای تکثیر سویه‌های باکتریایی  $A_4$  و 15834(GUS) مقاوم به آنتی بیوتیک کانامایسین، از محیط LB استفاده گردید.

**محیطهای هم کشتی و القاء ریشه مویین:** طرز تهیه این محیطهای کشت در جدول ۱ مشخص شده است.

جدول ۱- اجزاء تشکیل دهنده محیطهای هم کشتی و القاء ریشه

ترکیبات	محیط القاء ریشه‌های مویین	محیط هم کشتی
نمک‌های MS	X <sub>1</sub>	X <sub>1</sub>
آگار (گرم در لیتر)	۷	۷
ساکارز	٪۳	٪۳
سفوتاکسیم (میلی گرم در لیتر)	۲۰۰	-
pH	۵/۷	۵/۵

**تراریختی گیاه:** از آگروباکتریوم های  $A_4$  و 15834(GUS) کشت شبانه در محیط LB مایع در دمای ۲۸ درجه سانتی گراد بر روی شیکر ۱۸۰ rpm تهیه شد. سپس محیط LB با سانتریفیوژ در ۳۰۰۰ rpm و دمای محیط به مدت ۱۵ دقیقه حذف گردید. رسوب سلولهای باکتری در محیط مخصوص آلوده سازی آگروباکتریوم که شامل نمکهای MS و استوسرینگون به همراه با ۵ درصد گلوکز (pH 5.2) بود، به صورت سوسپانسیون درآمد (به نسبت ۲ : ۱). این سوسپانسیون به مدت ۳ ساعت تکان داده شد و جهت تراریختی استفاده گردید.

برای انجام تراریختی قطعات برگی به مدت ۳ دقیقه در سوسپانسیون سلولی باکتری غوطه‌ور شدند. سپس رطوبت اضافی قطعات برگی توسط کاغذ صافی استریل گرفته شده و در نهایت به محیط هم کشتی برده شدند. مرحله هم کشتی به مدت ۲ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد



جدول ۲- خصوصیات آغازگرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژنهای *GUS* و *rolB*

نام آغازگر	توالی 5'-3'	دمای Annealing	طول نوکلئوتید	طول قطعه حاصل
<i>rolB</i> Forward primer	ATGGATCCCAAATTGCTATTCCCCACGA	54 °C	28	780 bp
<i>rolB</i> Reverse primer	TTAGGCTTCTTTCATTCCGGTTTACTGCAGC	54 °C	30	
<i>GUS</i> Forward primer	GGTGGGAAAGCGCGTTACAAG	62 °C	21	320 bp
<i>GUS</i> Reverse primer	TGGATTCCGGCATAGTAAA	62 °C	20	

جدول ۳- شرایط دمایی و زمانی PCR

تعداد دورها	زمان	دما	فاز
۱	۵ دقیقه	۹۴ درجه سانتی‌گراد	Denaturation
	۳۰ ثانیه	۹۴ درجه سانتی‌گراد	Denaturation
۳۰	۱ دقیقه	۶۲-۵۴ درجه سانتی‌گراد	Annealing
	۱ دقیقه	۷۲ درجه سانتی‌گراد	Extension
۱	۱۰ دقیقه	۷۲ درجه سانتی‌گراد	Final Extension

آگارز و الکتروفورز مورد تأیید قرار گرفت. طول قطعه تکثیر شده برای ژن *rolB*، ۷۸۰ جفت باز و برای *GUS*، ۳۲۰ جفت باز بود. از مارکر اندازه Fermentas GeneRuler 1kb DNA Ladder استفاده گردید (شکل ۲).



شکل ۱- ریزنمونه‌های تراریخت شده توسط آگروباکتریوم: A: ریزنمونه شاهد. B و C ریشه‌های مویین تولید شده

ترکیبات فنلی: نتیجه آزمون Mann-Whitney حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین مقدار ترکیبات فنلی ریشه‌های طبیعی (گروه کنترل) و ریشه‌های مویین (گروه

اندازه گیری وزن تر ریشه‌ها: به منظور تعیین وزن تر ریشه‌ها، نمونه‌ها با ترازو با دقت ۰/۰۰۱ گرم (Sartorius TE14S) وزن شدند و وزن بر اساس گرم بر ریز نمونه گزارش گردید.

آنالیز آماری داده‌ها: در این تحقیق میزان ترکیبات فنلی و بیومس ریشه‌های مویین (تراریخت) و ریشه‌های طبیعی (گروه کنترل) که هر گروه شامل ۱۰ تکرار بود، مقایسه شد. بدین منظور از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون Mann-Whitney استفاده شد.

## نتایج

ریشه‌های مویین: در ریزنمونه‌های شستشو داده شده با آنتی بیوتیک سفوتاکسیم با غلظت ۵۰۰ mg/L و انتقال یافته به محیط فاقد هورمون بعد از دو هفته ریشه‌های مویین ظاهر شدند (شکل ۱).


الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز: صحت انتقال ژن توسط بارگذاری محصولات PCR به روی ژل

## بحث

تأیید مولکولی: باکتری *اگروباکتریوم رایزوژنز* با انتقال قطعه T-DNA حاوی ژن ریشه‌زایی به سلولهای گیاهی آنها را تراریخت می‌نماید (۳، ۵ و ۶).

تراریخت) وجود دارد و میزان ترکیبات فنلی در ریشه‌های مویین بیشتر است (شکل ۳).

وزن‌تر: نتیجه آزمون Mann-Whitney حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین وزن تر ریشه‌های طبیعی (گروه کنترل) و ریشه‌های مویین (گروه تراریخت) وجود دارد و وزن تر ریشه‌های مویین بیشتر از ریشه‌های عادی می‌باشد (شکل ۴).



شکل ۲ - نتایج PCR ژنومی ژنهای *roIB* و *GUS* در ریشه‌های مویین

**roIB -A:** ۱. کنترل منفی (نمونه فاقد DNA) ۲. کنترل مثبت (نمونه با DNA پلاسمیدی) ۳، ۴، ۶ و ۷. ریشه‌های تراریخت ۵. GeneRuler 1 Ladder(kb)  
**GUS -B:** ۱ و ۲. ریشه‌های تراریخت ۳. کنترل مثبت (نمونه با DNA پلاسمیدی) ۴. GeneRuler 1 kb Ladder ۵. کنترل منفی (نمونه فاقد DNA)


تراریخت بودن گیاهان مورد نظر بود. در مطالعه انجام شده توسط رهنما و همکاران در سال ۲۰۰۸ جهت اثبات انتقال ژن توسط *اگروباکتریوم* در گیاه *PCR* خارمریم انجام شد، طول قطعه حاصل از *PCR* برای  $A_4$ ، ۷۸۰ جفت باز و برای *GUS*، ۳۲۰ جفت باز بود (۲۳). همچنین Santos و همکاران (۲۰۰۵) کشت ریشه‌های تراریخت گیاه انجدان رومی به وسیله تلقیح با سویه‌های  $A_4$  و *GUS* 15834 را

در مطالعه حاضر تراریختی ریزنمونه برگ گیاه چه تریچه و ایجاد ریشه‌های مویین با *اگروباکتریوم رایزوژنز* سویه‌ها با انتقال ژنهای *rol* صورت گرفت. اگرچه رشد سریع با تولید انشعابات فراوان در محیط کشت فاقد هورمون، معرف ریشه‌های مویین مورد مطالعه بود (۳ و ۲۵)، با این حال بررسی ماهیت تراریخته آنها توسط تکنیک *PCR* انجام شد و تکثیر قطعه ۷۸۰ جفت بازی مربوط به ژن *roIB* بیانگر


در تایید این فرض، گزارش شده که افزایش غلظت اکسین در ریشه‌ها باعث ایجاد ریشه‌های فرعی بیشتر و کوتاه شدن طول ریشه‌ها می‌شود (۳). در برخی مطالعات نشان داده شده که ورود ژنهای خارجی به ویژه ژن مولد اکسین توسط اگروباکتریوم رایزوزنز به گیاه باعث بر هم زدن تعادل هورمونهای گیاهی شده که خود باعث القاء ریشه در گیاهان تراریخت، کاهش غالبیت انتهایی، افزایش شاخه دهی و ایجاد برگهای چروکیده می‌گردد (۱۳). مکانیسم مشخص و قطعی که ژنهای *rolB* سبب ایجاد ریشه‌های موپین می‌شود هنوز ناشناخته باقی مانده است. ولی این‌گونه به نظر می‌رسد که ژن *rolB* سبب افزایش حساسیت به اکسین در سلولهای تراریخت شده می‌شود که این عامل می‌تواند سبب ایجاد ریشه‌های موپین گردد (۳). احتمال دیگر، پلاسمید Ri در اگروباکتریوم رایزوزنز حامل دو ژن *aux1* و *aux2* می‌باشد که هر دو مسئول بیوسنتز اکسین در گیاهان تراریخت می‌باشند (۸). همان‌طور که مطالعات قبلی نشان می‌دهد بیان اکسین باعث القاء ریشه در گیاهان تراریخت می‌گردد. در مطالعه حاضر این‌گونه می‌توان ایجاد ریشه‌های موپین را توجیه کرد که بیان ژن *rolB* با همکاری ژنهای *aux1* و *aux2* موجود در بازوی راست T-DNA اگروباکتریوم رایزوزنز سبب این امر می‌گردد.

**ترکیبات فنلی:** در سالهای اخیر کشت ریشه‌های موپین به منظور تولید متابولیت‌های با ارزش در تعدادی از گونه‌های گیاهان دارویی در مقیاس تجاری صورت گرفته است (۲۶). میزان تولید ترکیبات ثانویه در ریشه‌های موپین بالاتر از ریشه‌های طبیعی یا سایر بافتها می‌باشد. بنابراین ریشه‌های موپین یک ابزار قدرتمند جهت انجام تحقیقات به منظور بالا بردن میزان تولید متابولیت‌های ثانویه و حتی آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی محسوب می‌شوند (۴ و ۲). در این تحقیق تراریختی گیاه تربچه توسط اگروباکتریوم رایزوزنز و تأثیر T-DNA اگروباکتریوم رایزوزنز بر میزان تولید ترکیبات فنلی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه بر روی ترکیبات فنلی نشان داد که میزان این ترکیبات در لاینهای

انجام دادند (۲۳). در این مطالعه، PCR با پرایمرهای ژن *rolB* ادغام قطعه T-DNA پلاسمید Ri به ژنوم ریشه‌های موپین که بعد از تراریختی با این سویه‌های اگروباکتریوم ایجاد شدند را تأیید کرد. همچنین تراریختی گیاه توسط ژن بتاگلوکورونیداز (*GUS*) و تأیید آن توسط پرایمر مربوط به این ژن بیانگر صحت انجام انتقال ژن می‌باشد.



شکل ۳ - مقایسه مقدار ترکیبات فنلی ریشه‌های طبیعی (گروه کنترل) و ریشه‌های موپین (گروه تراریخت) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ می‌باشد.



شکل ۴ - مقایسه وزن تر ریشه‌های طبیعی (گروه کنترل) و ریشه‌های موپین (گروه تراریخت) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح ۵٪ می‌باشد.

**مورفولوژی ریشه‌های تراریخت:** ریشه‌های موپین ایجاد شده در مطالعه حاضر در مقایسه با ریشه‌های شاهد انشعابات بیشتری ایجاد کرده و کوتاه‌تر بودند که دلیل آن احتمالاً بیوسنتز بیشتر اکسین در ریشه‌های تراریخت است.

مهمی در حذف رادیکالهای آزاد و جلوگیری از تبدیل هیدرو پراکسیدها به رادیکالهای آزاد را دارند نیز افزایش می‌یابد (۱۲). تحقیقات صورت گرفته بین اثر آنتی‌اکسیدانی و مقدار ترکیبات فنلی، رابطه مستقیم را نشان داده است (۱۹). مکانیسمی که T-DNA آگروباکتریوم رایزوزنز سبب افزایش فعالیت آنزیم‌ها یا کاهش سطوح  $H_2O_2$  در گیاهان می‌شود هنوز مشخص نشده است اما احتمالاً ژنهای *rol* بر آن تأثیر دارد (۲۵ و ۲۷).

هر چند در مورد نقش ژنهای *rol* بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های مویین و گیاهان باز زایی شده از آنها اطلاعات تقریباً کاملی موجود می‌باشد ولی تاکنون مطالعات کمی به روی تأثیر مستقیم این ژنها در تولید متابولیت‌های ثانویه انجام شده است. به تازگی مشخص شده است که ژنهای *rol* نقش فعال‌کنندگی در تولید متابولیت‌های ثانویه در خانواده‌های مختلف از جمله سولاناسه داشته به نحوی که در بعضی موارد، تأثیر فعال‌کنندگی یک تک ژن *rol* برای غلبه بر کمبود تولید متابولیت‌های ثانویه در سلولهای گیاهی کشت شده کافی بوده است (۲۹). طبق گزارشهای اخیر بیان ژن *rolC* با تولید آلکالوئیدهای تروپانی همبستگی دارد (۱۵ و ۲۴).

تراریخت شده نسبت به لاینهای کنترل افزایش می‌یابد، افزایش سطح این ترکیبات در مطالعه انجام شده با داده‌های گزارش شده مطابقت دارد (۱، ۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۵). مطالعات نشان داده است که تراریختی توسط آگروباکتریوم سبب افزایش آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی و فعال شدن سیستمهای دفاعی می‌شود. افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی ممکن است به دلیل تحریک برخی از ژنهای مربوط به دفاع در برابر عوامل خارجی همانند ویروسها یا ویروئیدها باشد (۲۸). علاوه بر این، مطالعه دیگر نشان می‌دهد که افزایش ترکیبات ثانویه در لاینهای تراریخت شده در ارتباط با مسیر سیگنالینگ  $H_2O_2$  که به دلیل تحریک برخی از ژنهای مربوط به دفاع در برابر عوامل خارجی ایجاد می‌شوند، می‌باشد. البته قابل ذکر است که T-DNA آگروباکتریوم رایزوزنز علاوه بر فعال کردن آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی مکانیسمهای دیگری برای کاهش سطح  $H_2O_2$  دارد که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است (۱۷). سایر مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد در اثر انتقال ژن و ایجاد ریشه‌های مویین میزان رادیکالهای آزاد افزایش می‌یابد و ترکیبات فنلی به دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی از جمله ترکیبات مهم گیاهان محسوب می‌شوند که نقش

## منابع

۲. مرادی، ا، شریفی، م و موسوی، الف (۱۳۹۰). بررسی بیان ژن H6H و ایزوفرمهای PMT تحت تاثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک در ریشه مویین و اندامهای مختلف شایبزرک (*Atropa balladonna* L.) مجله زیست‌شناسی ایران. جلد ۲۴. شماره ۳. صفحه ۳۶۶-۳۷۲.

3.

4. Bulgakov V, Gorpenchenko T, Veremeichik G, Shkryl Y, Tchernodod G, Bulgakov D, Aminin D and Zhuravlev N, The *rolB* gene suppresses reactive oxygen species in transformed plant cells through the sustained activation of antioxidant defense. *Plant Physiol*. 2012. 158(3): 1371-1381.

5. Bulgakov V, Aminin D, Shkryl Y, Gorpenchenko T, Veremeichik G, Dmitrenok P and

۱. شبانی، ل و احسان پور، ع، ا (۱۳۸۸). القاء آنزیمهای آنتی‌اکسیدان، ترکیبات فنولیک و فلاونوئید در کشت در شیشه شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra* L.) با استفاده از متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید. مجله زیست‌شناسی ایران. جلد ۲۲. شماره ۴. صفحه ۶۹۱-۷۰۳.

Zhuravlev Y, Suppression of reactive oxygen species and enhanced stress tolerance in *Rubia cordifolia* cells expressing the *rolC* oncogene. *Mol Plant Microbe Interact*. 2008. 21(12): 1561-1570.

6. Chilton M, Petit A, Tepfer D, Casse-Delbart F and Tempé J, *Agrobacterium rhizogenes* inserts T-DNA into the genomes of the host plant root cells. *Nature*. 1982. 295: 432 - 434.

7. Gururaj H, Kumar V, Prasad, Ravishankar and Sharma, *Agrobacterium rhizogenes* mediated genetic transformation resulting in hairy root formation is enhanced by ultrasonication and acetosyringone treatment. *Electronic J. of Biotech.* 2006. 349-357.
8. Gutierrez R and Perez R, *Raphanus sativus* (Radish): their chemistry and biology. *Scientific World Journal*, 2004. 4: 811-837.
9. Hashem E A, Estimation of the endogenous auxins and cytokinins in hairy roots incited on *Solanum dulcamara* plants by Ri plasmid of *Agrobacterium rhizogenes*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 2009. 3: 142-147.
10. Hook I, Secondary metabolites in hairy root cultures of *Leontopodium alpinum* Cass, *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 1994. 38(2-3): 321-326.
11. Hu and Du M, Hairy root and its application in plant genetic engineering. *J. of Integrative Plant Biol*, 2006. 48: 121-127.
12. Hussain M, Ansari F, Rahman M, Current approaches toward production of secondary plant metabolites. *J Pharm Bioallied Sci*, 2012 4(1): 10-20.
13. Jimoh A. A, Adedapo AA and A. J. , Polyphenolic Contents and Biological Activities of *Rumex ecklonianus*, *Pharm. Biol.* 2008. 46: 333-340
14. Mercuri A., Bruna S., De Benedetti L., Burchi G., Modification of plant architecture in *Limonium* ssp. induced by rol genes. *Plant Cell Tiss and Org. Culture*. 2001. 65: 247-253.
15. Mishra B. and Ranjan R, Growth of hairy-root cultures in various bioreactors for the production of secondary metabolites. *Biotechnol Appl Biochem*. 2008. 49(Pt 1): 1-10.
16. Moyano P, Fornalé S, Cusidó RM and Bonfill M, Piñol MT, Effect of *Agrobacterium rhizogenes* T-DNA on alkaloid production in Solanaceae plants, *Phytochemistry*. 1999. 52: 1287 - 1292.
17. Murray MG and Thompson WF. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA *Nucleic Acids Res.* 1980. 8(19): 4321-4325.
18. Nikravesh R, Khavari-Nejad A, Rahimian H and Fahimi H, Study of antioxidant enzymes activity and isozymes pattern in hairy roots and regenerated plants in *Nicotiana tabacum*, *Acta Physiologiae Plantarum*. 2012. 34(2): 419-427.
19. Ono N and Tian L, The multiplicity of hairy root cultures: prolific possibilities. *Plant Sci.* 2011. 180(3): 439-446.
20. Ozgen M, Scheerens J. C, Reese R. N. and Miller R. A, Total phenolic, anthocyanin contents and antioxidant capacity of selected elderberry (*Sambucus canadensis* L.) accessions, *Pharmacogn Mag.* 2010. 6(23): 198-203.
21. Perry D. S, Shin E. D, Getzoff D and Tainer J. A, The structural biochemistry of the superoxide dismutases, *Biochim Biophys Acta.* 2010. 1804(2): 245-262
22. Pistelli L, Giovannini A, Ruffoni B, Bertoli A and Pistelli L , Hairy root cultures for secondary metabolites production, *Adv Exp Med Biol.* 2010. 698: 167-184.
23. Rahnama H, Hasanloo T, Shams MR. and Sepehrifar R. Silymarin production in hairy root culture of *Silybum marianum* L. Gaertn. *Iranian J. Biotechnol.* 2008. 6: 113-118.
24. Santos PAG, Figueiredo AC, Oliveira MM, Barroso JG, Pedro LG, Deans AG, Scheffer AJC. Growth and essential oil composition of hairy root cultures of *Levisticum officinale* W.D.J. Koch (lovage). *Plant Sci.* 2005. 168: 1089-1096.
25. Sevon, N. and K. M. Oksman-Caldentey, *Agrobacterium rhizogenes*-mediated transformation: root cultures as a source of alkaloids. *Planta Med.* 2002. 859-868: (10)68
26. Srivastava S and Srivastava k, Hairy root culture for mass-production of high-value secondary metabolites, *Crit Rev Biotechnol.* 2007. 27(1): 29-43.
27. Veena V and Taylor C, *Agrobacterium rhizogenes*: recent developments and promising applications. *In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant.* 2007. 43(5): 383-403.
28. Victor and. Zhuravlev, Inhibitory effect of the *Agrobacterium rhizogenes* rolC gene on ramosiin and rosmarinic acid production in *Eritrichium sericeum* and *Lithospermum erythrorhizon* transformed cell cultures, *Planta Med.* 2005. 221: 471-478.
29. Yang C. M, Zeng L, Zhang L, Liu X, Lan and Liao Z, Improvement of tropane alkaloids production in hairy root cultures of *Atropa belladonna* by over expressing pmt and h6h genes, *Plant Omics J.* 2011. 4: 29-33.



30. Zhong j, Biochemical Engineering of the Production of Plant-Specific Secondary Metabolites

by Cell Suspension Cultures. Plant Cells, Springer Berlin Heidelberg, 2001. 72: 1-26.

## **Production of phenolic compounds in hairy roots culture of *Radish (Raphanus sativus L.)***

**Beyzaee S., Safipour Afshar A. and Saeid Nematpour F.**

Department of Biology Dept., Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, I.R. of Iran

### **Abstract**

*Agrobacterium rhizogenes* causes hairy root disease in plants. The hairy roots produced by *A. rhizogenes* infection are characterized by high growth rate and genetic stability. Hairy root induction cause changes in plant Secondary metabolites production. Phenolic compounds (Flavonoids, Tannins and Anthocyanins) are important antioxidants in radish. In this work, for induction of hairy roots, leaf explants transformed with two *A. rhizogenes* strains ( $A_4$  and 15834(GUS)). Generated Hairy roots confirmed with PCR. Also, Phenolic compounds content in hairy roots was measured. Amplification of 780bp fragment for *rolB* and 320bp for GUS in transgenic roots confirmed the production of hairy roots. Difference of Phenolic compounds between transgenic and non-transgenic roots was significant. Our results indicate that the insertion of *A. rhizogenes* T-DNA in to the plant genome stimulate plant defense responses and increase the production of Phenolic compounds.

**Key words:** *Agrobacterium rhizogenes*, transgenic, hairy root, *Raphanus sativus*