

## طول عمر گل‌های شاخه بریده ژربرا تحت تأثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید

محمد رضا قلمبران\*، محمد عبداللهی و فرانسواز کریستین برنارد

ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه علوم گیاهی

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۰/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۳۰

### چکیده

زیبایی گل ژربرا به طول عمر گلبرگ‌های آن وابسته است و طول عمر گلبرگ‌ها به حفظ آب بافت گلبرگ‌ها و فعالیتهای متابولیسمی سلول‌ها بستگی دارد. تولید کنندگان گل شاخه بریده از ترکیباتی که نقش حفاظت و تقویت کننده فعالیتهای متابولیسمی سلول و توانایی حفظ پتانسیل آب بافتها و دفع کننده عوامل بیماریزا را دارند، استفاده می‌کنند. تحقیق حاضر با هدف تعیین طول عمر و فعالیتهای متابولیسمی سلول‌های بافت گلبرگ‌ها تحت مصرف اسانس آویشن و سالیسیلیک‌اسید، اجرا شد. تیمارها، غلظتهایی از اسانس آویشن (۰، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میکرولیتر در لیتر) و سالیسیلیک اسید (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر) و استفاده همزمان از آنها در محیط آبی نگهداری گل‌های شاخه بریده بودند. تیمارها به صورت فاکتوریل (۴×۴) در قالب آماری کاملاً تصادفی در سه تکرار و در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. مهمترین صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عبارت بود طول عمر، محتوی نسبی آب، فعالیت آنزیمها (فنیل آلانین آمونیاپاز، پراکسیداز و کاتالاز)، محتوی مالون دی آلدئید و محتوی آنتوسیانین در سلول گلبرگ‌ها. مهمترین نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از غلظت ۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر از اسانس آویشن در ظرف نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا به دلیل داشتن خواص آنتی‌اکسیدانت و ضد میکروبی طول عمر گل‌ها را نسبت به شاهد ۴ روز افزایش داد. همچنین غلظت ۲۰۰۰ میکرو مول بر لیتر از سالیسیلیک‌اسید به دلیل افزایش توان سیستم دفاعی بافت گلبرگ‌ها از طریق افزایش مقابله به تنش اکسیداتیو سلول‌ها طول عمر گل‌های شاخه بریده ژربرا را از ۴ روز به ۸ روز افزایش داد.

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۲۱۲۲۴۰۵۷۰۶، پست الکترونیکی: m\_ghalamboran@sbu.ac.ir

### مقدمه

گل‌هایی که در فرانسه و اروپا به عمل می‌آید در ایران می‌توان یافت" (۶). با وجود استعدادهای طبیعی سرزمین ایران مانند تنوع شرایط آب و هوایی، خاک‌های نسبتاً غنی، نور کافی، نیروی کار ارزان و دسترسی نزدیک به بازارهای بین‌المللی، هنوز صنعت تولید گل از رشد و توسعه رضایت بخشی برخوردار نیست. از مهمترین دلایل رکود تجارت گل‌ها در بازارهای داخلی و خارجی، پژمردگی سریع، کاهش طول عمر و کیفیت گل‌ها پس از جدا شدن از گیاه اصلی است. لذا اگر چه گل‌های شاخه بریده ارزش اقتصادی زیادی دارند، ولی قابلیت فسادپذیری بالایی نیز دارند. به ویژه وقتی که دمای محیط پرورش گل‌ها و محل

صادرات گل ایران از سال ۱۳۷۰ با ۵۰۰ هزار دلار شروع شد و تاکنون با یک‌روند صعودی به مرز ۴۰ میلیون دلار رسیده است، اما با جایگاه واقعی خود در بازار حدود ۲۰ میلیارد دلاری جهانی فاصله زیادی دارد و برای وارد شدن به بازارهای جهانی، به بهبود روش‌های تولید و افزایش شاخص‌های کیفی و کمی تولید گل‌ها مطابق با استانداردهای جهانی نیازمند است (۵). بر اساس مستندات تاریخی، موطن اصلی بسیاری از گل‌های زیبا که امروزه به‌عنوان گیاه زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت می‌شوند ایران بوده است. در قرن ۱۷ میلادی شاردن که از ایران بازدید کرد، در سفرنامه خود درباره باغ‌های ایران چنین می‌نویسد: "تمام

نگهداری شاخه‌های گل، بالا باشد، کاهش طول عمر و کیفیت گلها شدت می‌یابد و این کاهش بیشتر در گلها و بافت‌هایی رخ می‌دهد که از محتوی نسبی آب بیشتری (مانند گلبرگها) برخوردار هستند.

گل‌های شاخه بریده ژربرا از راسته دولپه‌ای‌ها و خانواده کاسنی یا کمپوزینه با نام علمی *Gerbera jamesonii* دارای اسامی رایج همچون Transvaal daisy, Barberton daisy, African daisy است (۲۱)، از ۱۰ گل‌پرطرفدار و معروف جهانی است و همچنین در ایران نیز از گل‌های طرفدار است که با داشتن تنوع رنگ و گلبرگ‌های زیبا از جایگاه فروش خوبی برخوردار است. یکی از مشکلات تولید و صادرات گل‌های شاخه بریده ژربرا در ایران کوتاه بودن نسبی طول عمر (گل‌های شاخه بریده ژربرا تولید شده در ایران حدود ۳ تا ۵ روز طول عمر دارند در حالی که در کشورهای اروپایی حدود ۵ تا ۷ روز عمر دارند) در مقایسه با کشورهای با آب و هوای نسبتاً سرد و خنک است. براساس نتایج یک مطالعه موردی (Case study) در شرایط مناطق تولید گل ژربرا در ایران، طول عمر گل‌های شاخه بریده بدون مصرف هیچ نوع ترکیبات نگهدارنده و در شرایط دمایی (۲۵-۲۷ درجه سانتی‌گراد) تقریباً به طور متوسط ۳ تا ۴ روز بود. پژمردگی در گل‌های ژربرا ابتدا با خمیدگی و لوله شدن گلبرگها و سپس خمیده شدن ساقه از نزدیکی طبق گل مشهود خواهد شد. اگر چه تقریباً تغییرات اندام گل‌های شاخه بریده در اکثریت گلها مشابه است، اما شدت و زمان تغییرات بین آنها متفاوت است. مهمترین عوامل مؤثر بر طول عمر گلها بعد از جدا شدن از گیاه اصلی عبارتند از: اثر ژنوتیپ گیاه، عوامل و شرایط محیطی قبل از برداشت (شامل نور، دمای محیط، میزان گاز دی‌اکسید کربن در محیط، رطوبت نسبی محیط، تغذیه گیاه و تهویه گلخانه)، شرایط هنگام برداشت (شامل سن فیزیولوژیکی شاخه غنچه و گیاه، زمان برداشت و نحوه برداشت) و شرایط پس از برداشت (شامل دمای محیط، رطوبت نسبی محیط، نور، کیفیت آب و میزان آلودگی

میکروبی در آب و ظروف نگهداری گل‌های شاخه بریده، سرعت تنفس و میزان حساسیت بافت‌های گیاهی به آسیب‌دیدگی) (۲۲).

طول عمر گلها برخلاف برگها ممکن است چند روز و در مواقعی تا چند ساعت بیشتر نباشد. نتایج برخی از تحقیقات نشان داده است که فرآیند پیری برگها ممکن است قابل برگشت باشد، اما در گلها قابل برگشت نیست. در حقیقت رفتار غیر قابل برگشت گلها نشان می‌دهد سرعت مرگ سلولی در گلها بالاست. کاهش طول عمر گل‌های شاخه بریده با فرآیند نرمال پیری در گل‌های جدا نشده از گیاهان متفاوت است. در حقیقت پیری یا زوال سلول‌های گیاهی به مجموع فرآیندهای فیزیولوژیکی پس از بلوغ گفته می‌شود که منجر به مرگ برنامه ریزی شده سلول، بافت، اندام و در نهایت تمام گیاه می‌شود (۱۲-۳). در حالی که سلولها و بافت‌های گل‌های شاخه بریده به دلیل آسیب ناشی از عمل بریدن و جدا شدن از گیاه اصلی، به سرعت دچار رخداد مرگ برنامه ریزی نشده خواهند شد. سپس با احتمال حمله و نفوذ عوامل بیماریزا به محل آسیب دیده و همچنین از دست دادن محتوی آب بافت از محل برش و عدم امکان تأمین کافی آب و مواد غذایی، فرآیند مرگ برنامه ریزی شده سلولها و بافت‌های گل نیز شدت می‌یابد. لذا عمل بریدن و جدا شدن شاخه گل از گیاه اصلی، باعث تشدید هر دو نوع فرآیند مرگ سلولی در بافتها و اندامهای گل شاخه بریده می‌شود که در نتیجه آن روند کاهش طول عمر گل شاخه بریده سریع تر خواهد شد. با این حال، تسریع مرگ سلولها در بافت گل‌های شاخه بریده نشانه شدت سرعت مقابله با تنش‌های ناشی از عمل بریدن و آسیب دیدگی بافت و همچنین نفوذ عوامل بیماریزاست که این مقابله به عنوان پاسخهای آنزیمی و متابولسمی شناخته می‌شوند و به منظور ایجاد تعادل در رشد سلولهای جدید و مرگ سلولهای پیر و یا آسیب دیده، تنفس سلولی و همچنین تنظیم فعالیت‌های متابولیکی سلولها در مواجهه با شرایط تنشها، رخ می‌دهد (۳). پس کوتاه شدن عمر

تأخیر انداختن فرآیند لیگنیفیکاسیون در محل بافتهای صدمه دیده موجب حفظ و تسریع در سیستم هدایت آبی ساقه گل‌های شاخه بریده می‌شوند ولی در غلظتهای بالا از ترکیبات میکروب‌کشها در بافتهای گیاهی باعث بروز خطر مسمومیت می‌شوند. باکتریها، قارچها و مخمرها به‌وسیله تولید اتیلن، انسداد آوند چوب، تولید مواد سمی و افزایش حساسیت به دمای پایین به گل‌ها آسیب می‌رسانند.

سیتوکینینها از جمله تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی هستند که کاربرد آنها قبل از انبارداری یا حمل‌ونقل طولانی در تاریکی به‌منظور کاهش تجزیه کلروفیل توصیه می‌شود. جیبرلینها مشابه سیتوکینینها از تجزیه و تخریب کلروفیل جلوگیری می‌کنند. آنها زرد شدن برگها را در سوسن به تأخیر می‌اندازند و طول عمر برگها و براکته‌های بنت‌قنسل را افزایش می‌دهند و پیری را در گلبرگهای آلسترومریا به تأخیر می‌اندازند و باز شدن جوانه میخک و گلایل بریده‌شده را سرعت می‌بخشند (۳۱). همچنین هورمونهای بازدارنده مانند اسید آبسزیک پژمرده شدن گل‌های در معرض نور را با بستن روزنه‌ها به تأخیر می‌اندازد ولی در تاریکی پیری گل را تحریک می‌کند. مواد شیمیایی بسیاری به‌عنوان ضد اتیلن در صنعت گل و گیاه به کار می‌روند. سالیسیلیک‌اسید به عنوان یکی از ترکیبات تقلیل دهنده فرآیند سنتز اتیلن در گیاه است. سالیسیلیک‌اسید از تبدیل آمینوسیکلوپروپان‌کربوکسیلات به اتیلن جلوگیری می‌کند. در حقیقت سالیسیلیک‌اسید با جلوگیری از بیان ژن ACC اکسیداز در مسیر تولید اتیلن باعث تأخیر پیری در گل‌های شاخه بریده می‌شود (۱۸). از طرفی دیگر سالیسیلیک‌اسید با تأثیری که بر آنزیمهای آنتی‌اکسیدانی دارد در از بین بردن رادیکالهای آزاد موجب تأخیر در روند پیری گل‌ها می‌شود (۱۴). علاوه بر این سالیسیلیک‌اسید با داشتن خاصیت ضد میکروبی جمعیت میکروارگانیسمها را کاهش داده و سبب بهبود جذب آب توسط گل می‌شود (۲۸). به‌علاوه آزمایشهایی که از یلماتی انجام داده است، نشان داد که ۵ - سولفوسالیسیلیک‌اسید به‌عنوان یکی از

گل‌های شاخه بریده متفاوت از کوتاه شدن عمر گل‌ها ناشی از فرآیند طبیعی پیری در سلولهاست و به همین دلیل سرعت کاهش طول عمر گل شاخه بریده بیشتر از روند کاهش طول عمر شاخه گل متصل به گیاه اصلی است. با این حال، حتی اگر گل‌ها از گیاه اصلی جدا نشوند باز در بین اندامهای یک گیاه حساس‌ترین بخش به فرآیند پیری، گل‌ها هستند و معمولاً علائم ظاهری پایان عمر گل‌ها با پژمردگی، ریزش و تغییر رنگ گلبرگها همراه است و این علائم از گلی به گل دیگر متفاوت می‌باشد.

طول عمر در گل‌های شاخه بریده، عبارت است از فاصله زمانی بین برداشت گل‌ها تا زمانی که گل‌ها ارزش زینتی خود را از دست‌داده باشند. پیری گلبرگها با تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعدد شامل افزایش فعالیت آنزیمهای هیدرولیز کننده، تجزیه ماکرومولکولها، افزایش تنفس و از بین رفتن ثبات غشاء و ساختمان بندی سلولی همراه می‌باشد (۳۲). از دیرباز برای تداوم طول عمر گل‌های شاخه بریده از محلولهای نگهدارنده که ترکیبات شیمیایی هستند و به ظرف آب نگهداری گل‌ها اضافه می‌شوند تا طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل‌ها را حفظ و افزایش دهند. این نوع ترکیبات شامل کربوهیدراتها، میکروب‌کشها، ترکیبات ضد اتیلن، تنظیم‌کننده‌های pH و تنظیم‌کننده‌های رشد هستند. معمولاً از ترکیبات نگهدارنده در طول چرخه فروش از تولیدکننده تا عمده‌فروشی و حتی خریدار نهایی استفاده می‌شود (۱).

کربوهیدراتها از طریق حفظ وظایف و ساختمان میتوکندری، تنظیم میزان آب به‌وسیله تعرق و افزایش جذب آب طول عمر بافتها را تقویت می‌کنند. بهبود کیفیت و افزایش طول عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده به‌وسیله قندها، سالهاست که شناخته‌شده است (۳۳). محلولهای نگهدارنده که حاوی غلظتهای کم تا متوسط از میکروب‌کشها هستند معمولاً حالت اسیدی داشته و از ازدیاد و تجمع باکتریها جلوگیری می‌کنند و از طریق به

شاخه‌های گل در داخل محلول نگهدارنده حاوی تیمارهای مورد آزمایش قرار گرفتند. رطوبت نسبی آزمایشگاه بین ۶۵ تا ۷۰ درصد و دمای محیط بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد اعمال گردید و از نور طبیعی به‌عنوان منبع نور استفاده گردید. طول ساعات روشنایی ۱۵ ساعت و ساعات تاریکی ۹ ساعت بود.

**روش استخراج اسانس آویشن:** برای تهیه اسانس آویشن از دستگاه کلونجر و روش تقطیر با آب استفاده شد. ۱۰۰ گرم برگ‌های گیاه آویشن شیرازی خشک آسیاب شده و سپس در بالن تقطیر داخل آب قرار داده شد و با دادن حرارت تا حد جوش آب به مدت ۳ ساعت اسانس‌گیری انجام شد و مقدار ۲ میلی‌لیتر اسانس آویشن استخراج شد. این فرآیند برای به دست آوردن مقدار کافی اسانس برای انجام آزمایش‌ها طی چندین مرحله تکرار گردید. جداسازی آب از اسانس به‌وسیله قیف دکانتور صورت گرفت و در مرحله آخر آب‌گیری پودر سولفات سدیم بدون آب حدود ۱ تا ۲ گرم به اسانس اضافه و بعد از صافی پنبه‌ای عبور داده شد. غلظت‌های ۶۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ میکرو لیتر در لیتر برای نگهداری گل‌های شاخه بریده ژبراً مورد استفاده قرار گرفتند.

**تهیه سالیسیلیک‌اسید:** ۱/۳۸ گرم از سالیسیلیک‌اسید یا ارتوهیدروکسی بنزوئیک اسید در ۲/۵ لیتر آب گرم با استفاده از دستگاه هیتر-مگنت استیرر حل شد و سپس با رقیق‌سازی غلظت‌های مورد نظر تهیه شد. ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ میکرومولار در لیتر برای نگهداری گل‌های شاخه بریده ژبراً مورد استفاده قرار گرفتند.

**آزمون تعیین خواص ضد میکروبی تیمارها:** به‌منظور تعیین خواص میکروبی تیمارها از باکتری‌های استاندارد، *Staphylococcus aureus* ATCC:25923 و *Escherichia coli* ATCC: 25922، همچنین باکتری‌های روی سطح دمگل گل ژبراً استفاده شد. باکتری‌های استاندارد از کلکسیون میکروبی انستیتو پاستور ایران تهیه، کشت و برای

مشتقات سالیسیلات‌ها در محلول گلجایی باعث بیشترین تأثیر برافزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده گلایل می‌شود (۲۲).

تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که آویشن شیرازی حاوی اسانس روغنی، تانن، ساپونین و ضد عفونی‌کننده‌های گیاهی می‌باشند، دو ماده مهم و فعال این گیاه تیمول و کارواکرول است که از ترکیبات اسانس روغنی می‌باشند (۲۶). بر اساس تحقیقات اخیر هر دو ترکیب مذکور توانایی حذف و یا کاهش تکثیر و فعالیت باکتری‌های بیماریزا را دارند و همچنین خاصیت ضد تولید توکسین دارند. از دیگر تأثیرات ترکیبات تیمول و کارواکرول خاصیت ضد آپوتوزیسی است و احتمال داده می‌شود که بدین وسیله از روند کاهش طول عمر و پیری سلول‌ها جلوگیری به عمل آورند (۱۰).

بنابراین به دلیل اینکه اثرات همزمان مصرف ترکیبات اسانس آویشن شیرازی و سالیسیک اسید بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبراً مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته بود و با توجه به اذعان مطالعات گذشته بر اهمیت ویژگی‌های مطلوب در ترکیبات ذکر شده، موجب شد تا تحت شرایط آزمایشگاهی اثرات مصرف ترکیبات اسانس آویشن شیرازی و سالیسیک اسید در محیط آبی نگهداری گل‌های شاخه بریده ژبراً قرمز با هدف تعیین عکس‌العمل طول عمر و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی گل‌ها، مورد آزمایش و مطالعه قرار گیرد.

## مواد و روشها

**تهیه گل:** گل‌های شاخه بریده ژبراً از گلخانه‌های خصوصی و تحقیقاتی آقای محمدی واقع در شهرستان پاکدشت استان تهران برداشت شدند. بعد از انتقال به آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی، انتهای تمام شاخه گل‌ها به‌صورت اریب برش داده شد و همگی به یک اندازه به طول ۳۰ سانتیمتر تنظیم شدند. سپس

و ۴۵۰ میکرولیتر گایاکول به غلظت ۲ درصد بود. جذب در طول موج ۵۱۰ نانومتر به مدت ۳ دقیقه خوانده شد.

**اندازه‌گیری فعالیت کاتالاز در گلبرگها:** برای اندازه‌گیری فعالیت کاتالاز ابتدا عصاره‌گیری به روش *Chance and Mahely* (۱۹۹۵) صورت گرفت (۱۹). بعد مقدار ۵۰ میلی‌گرم بافت گلبرگ به مدت ۲ دقیقه در هاون با ۲ میلی‌لیتر بافر فسفات سدیم (pH 6.8, 0.1 M) هموزن شد. عصاره‌ها با ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شدند و محلول رویی برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی و مقدار پروتئین محلول استفاده شد. به ۱/۵ میلی‌لیتر بافر فسفات (pH 6.8, 50mM)، ۲۰۰ میکرولیتر عصاره آنزیمی و ۱۰۰ میکرولیتر هیدروژن پراکسید اضافه شد. فعالیت آنزیمی با اضافه کردن هیدروژن پراکسید به مخلوط واکنش شروع می‌شود. میزان کاهش جذب نور در طول موج ۲۴۰ نانومتر به مدت ۸ دقیقه توسط اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد.

**اندازه‌گیری فعالیت فنیل آلانین آمونیاز در گلبرگها:** برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیاز از روش *Zhan et al* (2009) (۲۰۰۹) استفاده شد (۳۳). به این منظور ۵ گرم بافت گیاه با ۴۰ میلی‌لیتر بافر فسفات سدیم با غلظت ۵۰ میلی‌مولار و pH ۸ که حاوی ۰/۱ گرم پلی‌وینیل پیرولیدین می‌باشد هموزن شد. عصاره‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند، سپس مخلوط واکنش حاوی ۱۰۰ میکرولیتر سوپرناتانت، ۵۰ میکرولیتر ال-فنیل آلانین با غلظت ۵۰ میکرومول، ۱۴۰۰ میکرولیتر بافر فسفات سدیم با غلظت ۵۰ میکرومول بود. مخلوط واکنش به مدت یک ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد و سپس جذب در طول موج ۲۹۰ نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد.

**اندازه‌گیری پروتئین کل بافت گلبرگها:** میزان سنجش پروتئینها به‌منظور محاسبه فعالیت وزنی آنزیمها به روش

سنجش خواص ضد میکروبی تیمارها از روش انتشار دیسک استفاده شد. سپس براساس نتایج حاصله از غلظتهای مؤثر و بازدارنده رشد باکتریها تیمارهای آزمایش انتخاب شد.

**تعیین و اندازه‌گیری شاخص طول عمر:** ابتدا بر اساس نتایج مطالعه موردی پیش از شروع آزمایشات، برای تعیین یک شاخص برای اندازه‌گیری طول عمر گل‌های شاخه بریده ژربرا، مدت‌زمانی که محتوی نسبی آب بافت گلبرگها از زمان جدا شدن از گیاه اصلی به کمتر از ۶۰ درصد تنزل پیدا کرد که این زمان نیز مصادف با پژمردگی ۵۰ درصد تعداد گلبرگها بود به عنوان شاخص و مبنای پایان طول عمر گل‌های شاخه بریده ژربرا در نظر گرفته شد.

**اندازه‌گیری محتوی نسبی آب بافت گلبرگها:** محتوی نسبی آب بر اساس روش *Barrs and Weatherley* (۱۹۶۲) اندازه‌گیری شد (۱۶). بدین منظور ابتدا وزن‌تر گلبرگها توسط ترازوی دیجیتال محاسبه شد. جهت اندازه‌گیری وزن اشباع، گلبرگها به مدت ۶ ساعت درون ظروف حاوی آب مقطر غوطه‌ور شدند تا حداکثر جذب آب صورت گیرد. سپس گلبرگها درون آون در دمای ۸۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. پس از ۲۴ ساعت وزن خشک آنها اندازه‌گیری شد. میزان محتوی نسبی آب با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

$$RWC = [(FW - DW) / (TW - DW)] \times 100$$

وزن اشباع: TW، وزن خشک: DW، وزن تر: FW

**اندازه‌گیری فعالیت گایاکول پراکسیداز در گلبرگها:** اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز به روش *and Ruley Sharma* (۲۰۰۴) انجام شد (۲۹). ۱۰۰ میلی‌گرم بافت گلبرگ با ۱ میلی‌لیتر بافر فسفات سدیم به غلظت ۰/۱ مولار بر روی یخ هموزن شد. عصاره‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. مخلوط واکنش حاوی ۱۰۰ میکرولیتر سوپرناتانت، ۴۵۰ میکرولیتر  $H_2O_2$  به غلظت ۱۷ میلی‌مولار

سپس نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری شدند. سپس به مدت ۳۰ دقیقه با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و سپس جذب در طول موج ۵۳۵ نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از غلظت‌های مختلف اسانس آویشن شیرازی (۰، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر) و سالیسیک اسید (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر) که اثرات آنها در آزمایشات فاکتوریل (۴×۴) در قالب آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی بر صفات آزمایشی، اندازه‌گیری و بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده توسط نرم افزار MSTATC انجام گرفت و مقایسات تیماری نیز از طریق آزمون حداقل اختلاف معنی دار با سطوح احتمال آماری ۹۵ و ۹۹ درصد محاسبه شدند. همچنین نمودارها در نرم افزار Excel رسم شدند.

### نتایج و بحث

نتایج آزمونهای ضد میکروبی (انتشار دیسکی): اثر اسانس آویشن شیرازی بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و دمگل گل ژربرا: نتایج آزمون انتشار دیسکی برای تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی بر روی باکتریهای مورد مطالعه در جدول ۱ نشان داد که اسانس آویشن شیرازی دارای اثرات ضد باکتریایی بود. با افزایش غلظت مصرفی اسانس آویشن از ۱۵۰ تا ۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر آب میزان بازدارندگی رشد باکتریهای مورد نظر افزایش یافت (تصویر ۱).

اثر سالیسیلیک اسید بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و دمگل گل ژربرا: نتایج آزمون انتشار دیسکی نشان داد که استفاده از غلظت‌های سالیسیلیک اسید بر روی باکتریهای مورد مطالعه تأثیری نداشت (جدول ۲ و تصویر ۲).

Bradford (۱۹۶۷) انجام شد (۱۷). برای رسم منحنی استاندارد، سرم آلبومین گاوی (BSA) در غلظت‌های معین با دو تکرار تهیه و پس از تعیین میزان جذب در طول موج ۶۳۰ نانومتر منحنی استاندارد رسم شد. سپس برای هر یک از نمونه‌ها از میانگین جذب با دو تکرار، برای محاسبه غلظت پروتئین نمونه‌ها استفاده شد.

اندازه‌گیری غلظت مالون‌دی‌آلدئید در گلبرگها: برای اندازه‌گیری غلظت مالون‌دی‌آلدئید در سلولها که به عنوان یک بیوماکر برای سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولها است از روش Heath and Packer (۲۰۰۹) استفاده شد (۲۳). ۱۰۰ میلی‌گرم از بافت گلبرگ در ۱/۵ میلی لیتر تری کلرواستیک اسید ۱ درصد هموزن شد. سپس مواد حاصله به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۰۰۰۰g سانتریفیوژ شدند. سپس به ۱ میلی لیتر سوپرناتانت، ۴ میلی لیتر از محلول تری کلرواستیک اسید با غلظت ۲۰ درصد که حاوی ۰/۵ درصد تیوباربیتریک اسید بود، اضافه شد. مخلوط واکنش به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد در حمام آب گرم حرارت داده شد. سپس به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد، و سپس جذب در طول موج ۵۳۲ نانومتر و ۶۰۰ نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. برای محاسبه میزان مالون‌دی‌آلدئید از فرمول زیر استفاده شد میزان ضریب خاموشی در این رابطه  $155Mm^{-1}.cm^{-1}$  می‌باشد:

$$A = \epsilon bc$$


$A$  = میزان جذب       $\epsilon$  = ضریب خاموشی

$b$  = عرض کووت       $c$  = غلظت مالون‌دی‌آلدئید

اندازه‌گیری غلظت آنتوسیانین در گلبرگها: اندازه‌گیری غلظت آنتوسیانین به روش Do and Cormier (۱۹۹۰) انجام شد (۲۰). به این منظور ۰/۵ گرم بافت گلبرگ در ۲ میلی لیتر ترکیب اتانول و اسیدکلریدریک ۱ درصد به نسبت‌های ۱۵:۸۵ در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد هموزن شد.

جدول ۱- نتایج اثر ضد باکتری اسانس آویشن شیرازی


نوع باکتری	غلظت اسانس آویشن شیرازی	میزان بازدارندگی رشد باکتری (هاله عدم رشد)
استافیلوکوکوس اورئوس	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۱۶ میلی متر
	۳۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۱۳ میلی متر
	۱۵۰ میکرو لیتر در لیتر	۸ میلی متر
	۷۵ میکرو لیتر در لیتر	۰ میلی متر
اشریشیاکلی	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۱۶ میلی متر
	۳۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۱۱ میلی متر
	۱۵۰ میکرو لیتر در لیتر	۹ میلی متر
	۷۵ میکرو لیتر در لیتر	۸ میلی متر
دمگل گل ژربرا	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۱۰ میلی متر
	۳۰۰ میکرو لیتر در لیتر	۹ میلی متر
	۱۵۰ میکرو لیتر در لیتر	۸ میلی متر
	۷۵ میکرو لیتر در لیتر	۹ میلی متر



تصویر ۱- اثر ضد باکتری اسانس آویشن شیرازی بر روی باکتریهای مورد مطالعه به روش انتشار دیسکی، (A) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، (B) باکتری اشریشیاکلی، (C) باکتری دمگل گل ژربرا.

جدول ۲- نتایج اثر ضد باکتریایی سالیسیلیک اسید

نوع باکتری	غلظت سالیسیلیک اسید	میزان بازدارندگی رشد باکتری (هاله عدم رشد)
استافیلوکوکوس اورئوس	۲۰۰۰ میکرومولار بر لیتر	۰ میلی متر
	۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۵۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۲۵۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
اشریشیاکلی	۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۵۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۲۵۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
دمگل گل ژربرا	۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۵۰۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر
	۲۵۰ میکرومولار در لیتر	۰ میلی متر




تصویر ۲- اثر ضد باکتری سالیسیلیک اسید بر روی باکتریهای مورد مطالعه به روش انتشار دیسکی، (A) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، (B) باکتری اشریشیاکلی، (C) باکتری دمگل گل ژربرا.

اثر برهمکنش اسانس آویشن شیرازی با سالیسیلیک اسید بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و دمگل گل ژربرا: نتایج آزمون انتشار دیسکی در جدول ۳ نشان داد به جز باکتری استافیلوکوکوس اورئوس استفاده

همزمان از اسانس آویشن شیرازی و سالیسیلیک اسید، رشد باکتریهای اشریشیاکلی و دمگل گل ژربرا را کاهش و باعث ایجاد هاله بازدارندگی رشد باکتری می‌شود (تصویر ۳).

جدول ۳- نتایج اثر ضد باکتریایی برهمکنش اسانس آویشن شیرازی با سالیسیلیک اسید

نوع باکتری	غلظت برهمکنش اسانس آویشن شیرازی با سالیسیلیک اسید	میزان بازدارندگی رشد باکتری (هاله عدم رشد)
استافیلوکوکوس اورئوس	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۵۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۰ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۵۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۰ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۰ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۰ میلی متر
اشریشیاکلی	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۵۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۱۰ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۵۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۸ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۸ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۸ میلی متر
دمگل گل ژربرا	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۵۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۱۱ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۵۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۱۱ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۱۱ میلی متر
	۶۰۰ میکرو لیتر در لیتر اسانس + ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر سالیسیلیک اسید	۱۱ میلی متر



تصویر ۳- اثر ضد باکتری برهمکنش اسانس آویشن شیرازی با سالیسیلیک اسید بر روی باکتریهای مورد مطالعه به روش انتشار دیسکی (A) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، (B) باکتری اشریشیاکلی، (C) باکتری دمگل گل ژربرا.

عکس العمل طول عمر گل‌های شاخه بریده ژربرا: نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره ۴ نشان داد که اثرات مصرف اسانس آویشن شیرازی و سالیسیلیک اسید در محلول آب نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا با احتمال




داشت (نمودار ۱). مصرف ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میکرومولار در لیتر از سالیسیک اسید در محلول آب نگهداری گلها با احتمال ۹۹ درصد بیشترین تأثیر افزایشی را نسبت به سایر تیمارها بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبربا داشت (نمودار ۲). همچنین مصرف همزمان ۳۰۰ میکرومولار در لیتر اسانس آویشن و ۱۰۰۰ میکرومولار در لیتر از سالیسیک اسید در محلول آب نگهداری گلها با احتمال ۹۵ درصد معنی‌دار شد و بر طول عمر گلها نسبت به سایر ترکیبات تیماری تأثیر افزایشی داشت.

۹۹ درصد معنی‌دار بود و گل‌های شاخه بریده تحت مصرف ترکیبات مذکور نسبت تیمار شاهد حدود ۳ روز بیشتر عمر کردند. نتایج مقایسات تیماری (آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار) در این آزمایش نشان داد که مصرف کلیه غلظت‌های اسانس آویشن نسبت به تیمار شاهد (محلول آب فاقد هر نوع ترکیب نگهدارنده) در سطح احتمال ۹۵ درصد بر افزایش طول عمر مؤثر بود، به طوری که مصرف ۳۰۰ و ۶۰۰ میکرومولار در لیتر در محلول آب نگهداری گلها بیشترین تأثیر بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبربا


جدول ۴ - تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آویشن و سالیسیلیک اسید بر میانگین مربعات صفات آزمایشی شده در بافت گلبرگها

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات صفات آزمایشی اندازه‌گیری شده در بافت گلبرگها											
		طول عمر		محتوی نسبی آب / درصد		فعالیت فنیل آمونیاکاز / واحد بر میلی گرم پروتئین در دقیقه		فعالیت گابا‌کول پراکسیداز / واحد بر میلی گرم پروتئین در دقیقه		فعالیت کاتالاز / واحد بر میلی گرم پروتئین در دقیقه		غلظت مالون دی‌دهید / نانومول / نانومول بر گرم	
		روز اول	روز چهارم	روز هفتم	روز اول	روز چهارم	روز هفتم	روز اول	روز چهارم	روز هفتم	روز اول	روز چهارم	روز هفتم
آویشن	۳	۳.۶۵*	۲.۶۴**	۲.۶۴**	۰.۱۸*	۰.۲۱**	۰.۵۲*	۰.۳۲**	۰.۲۰**	۱.۶۶*	۰.۳۴**	۰.۶۶*	۰.۰۳**
سالیسیک اسید	۳	۵.۶۴**	۰.۷۸**	۰.۷۸**	۰.۰۸*	۰.۱۰*	۰.۱۰*	۰.۰۸*	۰.۰۸*	۱.۱۶*	۰.۳۵**	۰.۲۹**	۰.۰۴**
آویشن * سالیسیک اسید	۹	۲.۲۱*	۲.۰۳**	۲.۰۳**	۰.۰۴**	۰.۱۳**	۰.۱۳**	۰.۱۳**	۰.۱۳**	۰.۷۹**	۰.۱۳**	۰.۷۸*	۰.۰۳**
خطا	۳۲	۱.۰۸	۱.۲۲	۱.۲۲	۰.۰۷	۰.۱۱	۰.۰۷	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۲۷	۰.۳۷	۰.۳۷	۰.۰۲

\*\*\*, \*\* به ترتیب نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال آماری ۱ درصد، و ۵ درصد، علامت NS نشان‌دهنده عدم اختلاف معنی‌دار



نمودار ۲. تأثیر غلظت‌های سالیسیک اسید بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبربا. حروف کوچک الفبای انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد



نمودار ۱. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبربا. حروف کوچک الفبای انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد

عوامل بیماریزا) می‌شوند. این پاسخ فیزیولوژیک اگرچه تاحدی موجب کاهش جذب محلول شده ولی از طرفی دیگر از برگشت آب و ترکیبات فلوئمی جلوگیری به عمل می‌آورد. همچنین اسانس آویشن به دلیل داشتن ترکیبات تیمول و کارواکرول نه تنها از رشد و تکثیر میکرو


افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده تحت مصرف اسانس آویشن به دلیل خاصیت ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی است. تهاجم عوامل میکروبی مانند باکتریها در محل برش ساقه موجب انسداد آوندی و تحریک فرآیند لیگنینیفیکاسیون (به عنوان عکس‌العمل دفاعی گیاه به

کلروفیل و میزان سرعت تعرق و تنفس در گیاه نقش مثبتی را اعمال نماید (۲۴). از طرفی دیگر استفاده از سالیسیک اسید می‌تواند موجب کاهش تنش اکسیداتیو در سلولها و بافتها شود و منتج به افزایش طول عمر گردد. نتایج به دست آمده از مصرف سالیسیک اسید بر طول عمر گل‌های شاخه بریده ژبررا در این آزمایشات با نتایج محمدی و همکاران که با استفاده از تیمار سالیسیلیک‌اسید و ساکارز باعث افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده آلسترومریا شدند، مطابقت داشت (۱۱).


**تغییرات محتوی نسبی آب بافت گلبرگها:** براساس نتایج تجزیه واریانس جدول شماره یک، استفاده از آویشن شیرازی و سالیسیک اسید تأثیر بسیار معنی‌داری بر حفظ میزان محتوی نسبی آب بافت گلبرگهای گل‌های شاخه بریده ژبررا در هفتمین روز از زمان جدا شدن از گیاه اصلی نسبت به تیمار شاهد نشان داد. همان طوری که در نمودار ۲ نشان داده شده است میزان کاهش آب بافت گلبرگها در تیمار شاهد از روز اول به پایان روز هفتم حدود ۵۰ درصد بوده در حالی که تیمارهای ۶۰۰ میکرومولار از اسانس آویشن و ۲۰۰۰ میکرو مولار از ترکیب سالیسیک اسید در محلول نگهداری گلها، به ترتیب حدود ۱۵ و ۱۰ درصد میزان آب بافت گلبرگها کاهش یافته بود. بنابراین وجود ترکیبات مذکور در محلول نگهداری گلها باعث شد سرعت از دست دادن آب بافت گلها کاهش یابد (نمودارهای ۳ و ۴).

ارگانسیم موجود در محلول آب نگهداری گلها جلوگیری می‌کند بلکه به دلیل داشتن خاصیت ضد آپوپتوزیستی بر تأخیر مرگ سلولها تأثیر داشته است. برخی از تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که استفاده از ترکیبات بازدارنده رشد میکروارگانیسمها با اثرگذاری بر روی پذیرنده‌های اتیلن از اثرات منفی آن جلوگیری می‌کنند و از این راه می‌توانند بر طول عمر سلولها و نهایتاً بر طول عمر بافت و اندام گیاه تأثیر مثبت داشته باشند. نتایج سلگی و همکاران که نشان دادند استفاده از اسانس آویشن شیرازی باعث بهبود طول عمر گل شاخه بریده ژبررا می‌شود، با نتایج به دست آمده در این آزمایشات مطابقت داشت (۳۰).

براساس نتایج این تحقیق مصرف سالیسیک اسید موجب افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده شد. از مهمترین دلایل تأثیر مثبت سالیسیک اسید بر طول عمر بافتهای گیاهی دخالت و تقلیل سرعت بیوسنتز اتیلن و تولید آن است. زیرا بافت گیاهان به محض صدماتی مانند بریدن و جدا شدن شاخه از گیاه اصلی، بلافاصله هورمون اتیلن را سنتز کرده و برای حفظ و تدوام حیات سلولها موجب تسریع مرگ سلولها به ویژه در محل خراشیدگی می‌شوند. لذا مصرف سالیسیک اسید به عنوان بازدارنده بیوسنتز اتیلن می‌تواند از پیری و مرگ سلولها تا حدی جلوگیری کند و باعث افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده شود (۲۷). سالیسیلیک‌اسید همچنین می‌تواند سبب تحریک فرایندگلدھی شود و در تنظیم عملکرد روزنه‌ها، محتوای




نمودار ۴. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر محتوی نسبی آب بافت گلبرگهای گل شاخه بریده ژبررا. حروف کوچک الفبای انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد



نمودار ۳. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر محتوی نسبی آب بافت گلبرگهای گل شاخه بریده ژبررا. حروف کوچک الفبای انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد

فعالیت‌های متابولیکی، منبع کربوهیدرات برای تنفس سلولها، دارای توانایی تعدیل پتانسیل اسمزی محلول آب بوده و نه تنها از خروج سریع مولکولهای آب جلوگیری می‌کند بلکه باعث تسهیل ورود مولکولهای آب به داخل بافت شاخه‌های گل می‌شود.


**تغییرات فعالیت فنیل آمونیلایز در بافت گلبرگها:** نتایج به دست آمده نشان داد، اثرات مصرف ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید در محلول آب نگهداری گل‌های شاخه بریده ژبریا بر میزان فعالیت فنیل آمونیلایز در سلولهای بافت گلبرگها از روز چهارم به بعد بسیار معنی دار بود (جدول شماره یک). غلظت ۳۰۰ میکرومولار از اسانس آویشن و ۱۰۰۰ میکرومولار از سالیسیک اسید در روز هفتم نسبت به سایر تیمارها بیشترین فعالیت فنیل آمونیلایز را نشان داد (نمودارهای ۵ و ۶). با این حال نتایج نشان داد که استفاده از سالیسیک اسید (با غلظت ۱۰۰۰ میکرومولار) بیشترین تأثیر افزایشی بر فعالیت فنیل آمونیلایز را حتی نسبت به غلظت ۶۰۰ میکرومولار اسانس آویشن داشت. فنیل آمونیلایز یکی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاهان است.



نمودار ۶. تأثیر غلظت‌های سالیسیک اسید بر فعالیت فنیل آمونیلایز در سلولهای گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژبریا. حروف الفبای کوچک انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد

مطابقت داشت (۷). این آنزیم نقش اصلی در اتصال مسیر سنتزی اسیدهای آمینه آروماتیک و حدواسط متابولیت‌های اولیه و متابولیت‌های ثانویه است و نقش کلیدی در تنظیم و


نتایج به دست آمده با یافته‌های میردهقان و همکاران که از اسانس آویشن شیرازی مرزه، آویشن و زنبان بر روی گل رز استفاده کرده بودند، مطابقت داشت (۱۳)، همچنین با یافته‌های محمدی که از تیمار سالیسیلیک‌اسید بر روی گل شاخه بریده آلسترومیریا استفاده کرده بودند مطابقت داشت (۱۵). به طور کلی محتوی نسبی آب در بافت شاخص مناسبی از وضعیت آب در گیاه است و در صورتی که مقدار آب جذب‌شده با آب تعرق شده برابر باشد محتوی نسبی تغییری نمی‌کند، اما وقتی که در جذب آب اختلالی پیش بیاید مقدار آن کاهش می‌یابد. در حقیقت عمل بریدن شاخه گل نه تنها باعث قطع انتقال آب به گلها خواهد شد بلکه به محض قرار گرفتن در محیط آبی که پتانسیل اسمزی محلول نیز کمتر از آب بافت شاخه گل باشد موجب خروج آب به همراه ترکیبات فلئومی به صورت ترشحات از محل بریدن به داخل محلول آب خواهد شد و به همین دلیل آب ظروف نگهداری شاخه‌های گل بعد از چند ساعت و یا چند روز کدر می‌شود. شاخه‌های گل علی‌رغم نیاز به حفظ آب بافت‌های خود، آب خود را از دست می‌دهند. استفاده از ترکیبات سالیسیک اسید و اسانس آویشن علاوه بر داشتن مزیت‌هایی مانند تقویت



نمودار ۵. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر فعالیت فنیل آمونیلایز در سلولهای گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژبریا. حروف الفبای کوچک انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد

این نتایج با یافته‌های نظری دلجو که از تیمار سالیسیلیک‌اسید بر روی گل شاخه بریده ژبریا با زمانهای ۸ ساعت، ۱۶ ساعت و ۲۴ ساعت استفاده کرده بود

این روند تحت مصرف ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید کمتر بود. غلظت‌های ۵۰۰ میکرومولار سالیسیک اسید و ۱۵۰ میکرومولار اسانس آویشن در هفتمین روز از زمان قطع شاخه‌های گل، بیشترین فعالیت پراکسیداز در بافت گلبرگها باعث شدند. مهمترین وظیفه آنزیم پراکسیداز کاهش و کنترل آسیب‌گونه‌های رادیکال اکسیژنی است و نقش حفاظت سلولها را از تخریب انواع رادیکالهای اکسیژنی مانند پراکسید هیدروژن دارد و پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می‌کند. بنابراین نقش مثبت ترکیبات سالیسیک اسید و اسانس آویشن در محلول آب نگهداری گلها از طریق بهبود فعالیت پراکسیداز بر حفظ حیات سلولها و تنفس عادی سلولها و جلوگیری از تخریب سلولها به وسیله گونه‌های رادیکالی بوده است که در نتیجه بهبود فعالیت پراکسیدازی سلولی، باعث افزایش طول عمر سلولهای بافت گلبرگها گل‌های شاخه بریده شده است. این نتایج با یافته‌های علی‌پور، طالبی و همکارانش و همچنین سلگی و همکاران که در نتیجه افزایش فعالیت پراکسیداز در سلولهای بافت گلبرگها، طول عمر گل شاخه بریده ژربرا افزایش کرده بود، مطابقت داشت (۸، ۹ و ۳۰).




نمودار ۸. تأثیر غلظت‌های سالیسیک اسید بر فعالیت پراکسیداز در سلولهای گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا. حروف الفبای کوچک انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد

آویشن و سالیسیک اسید بر فعالیت گایاکول پراکسیداز معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت کاتالاز

تولید ترکیبات حاصل از مسیر فنیل پروپانوئیدی ایفاء می‌کند. همچنین یک نشانگر بیوشیمیایی از امکان وجود فعالیت مکانسیم دفاعی غیر آنزیمی در بافت‌های گیاهی است هنگامی که تحت شرایط تنش‌های محیطی، زیستی و صدمات ناشی از خراشیدگی واقع می‌شوند. فعالیت فنیل آلانین آمونیلایز تحت تأثیر تنشها، مرحله رشد و تمایز سلولی تغییر می‌کند. بنابراین سالیسیک اسید از طریق افزایش مؤثر فعالیت فنیل آلانین آمونیلایز باعث افزایش تولید متابولیت‌های دفاعی مانند فلاونوئیدها، کومارینها، تانن و لیگنین می‌شود که با توجه به تأثیر تنش وارد به شاخه گل ناشی از عمل بریدن، فعالیت آنزیم مذکور افزایش کرده و از طرفی دیگر در فرآیند سنتز لیگنین و دفع عوامل بیماریزا نقش مثبتی ایفاء کرده است و بستر مناسب فعالیت‌های بیوشیمیایی لازم را برای افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده فراهم می‌نماید (۴).


**تغییرات فعالیت پراکسیداز در بافت گلبرگها:** نتایج اندازه‌گیری فعالیت پراکسیداز نشان داد که تحت تأثیر مصرف غلظت‌های اسانس آویشن و سالیسیک اسید قرار داشته است (جدول ۱). اگرچه فعالیت پراکسیداز در تمامی تیمارهای آزمایش یک روند نزولی داشت (نمودارهای ۷ و ۸)، اما



نمودار ۷. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر فعالیت پراکسیداز در سلولهای گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا. حروف الفبای کوچک انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد


**تغییرات فعالیت کاتالاز در بافت گلبرگها:** براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱) تأثیر استفاده از ترکیبات اسانس

کرده بود، مطابقت داشت (۱۴). استفاده از اسانس آویشن باعث فعال شدن سیستم آنتی‌اکسیدان گل‌های شاخه بریده ژربرا شده است و وجود تأثیر افزایشی اسانس آویشن بر فعالیت کاتالاز در این آزمایش با یافته‌های چاوشی که از تیمار ضد میکروبی اتانول بر روی گل‌های رز و مریم استفاده کرده بود مطابقت داشت (۲).



نمودار ۱۰. تأثیر غلظت‌های سالیسیک اسید بر فعالیت کاتالاز در سلول‌های گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا. حروف الفبای بزرگ انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد


تحت تیمار شاهد در طول روز‌های بعد از جدا شدن از گیاه اصلی کاهش یافت، در حالی که تحت مصرف اسانس آویشن و سالیسیک اسید افزایش پیدا کرد و بیشترین فعالیت کاتالاز در غلظت‌های ۳۰۰ میکرومولار از اسانس آویشن و ۲۰۰۰ میکرومولار از سالیسیک اسید مشاهده شد (نمودارهای ۹ و ۱۰). این نتایج با یافته‌های منصوری که از محلول‌پاشی سالیسیلیک‌اسید بر روی گل ژربرا استفاده




نمودار ۹. تأثیر غلظت‌های اسانس آویشن بر فعالیت کاتالاز در سلول‌های گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا. حروف الفبای بزرگ انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد

شده نیز موجب تشدید ادامه فرآیند پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی دیواره‌های سلولی می‌شوند. ترکیب مالون دی‌آلدئید فرآورده نهایی فرآیند پراکسیداسیون لیپیدی است که به عنوان یک بیومارکر فرآیند تخریب سلولی معروف است. بنابراین برای جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی سلولی وجود و افزایش فعالیت‌های آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی برای کاهش غلظت‌های مولکول‌های رادیکالی لازم است. در نتیجه می‌توان گفت که ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید با بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی از تخریب سلول‌ها از نوع پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء سلول‌های بافت گلبرگها جلوگیری کرده است و از این طریق باعث افزایش فعالیت و طول عمر سلول‌های بافت گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا شده است.

**تغییرات غلظت مالون دی‌آلدئید در بافت گلبرگها: نتایج**  
تجربه واریانس نشان داد (جدول ۱) مصرف ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید بر غلظت مالون دی‌آلدئید در سلول‌های بافت گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژربرا اثرات معنی‌دار داشت. استفاده از ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید در آب نگهداری گل‌های شاخه بریده نسبت به تیمار شاهد که از ترکیبات مذکور استفاده نشده بود باعث شد که غلظت مالون دی‌آلدئید در سلول‌های بافت گلبرگ افزایش نیابد و همچنین حداقل غلظت مالون دی‌آلدئید تولیدی در سلول‌های بافت گلبرگ در هفتمین روز در غلظت‌های ۳۰۰ میکرومولار از اسانس آویشن و ۱۰۰۰ میکرومولار از سالیسیک اسید به دست آمد (نمودارهای ۱۱ و ۱۲). مالون دی‌آلدئید از پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولی حاصل می‌شود و رادیکال‌های آزاد سبب پراکسیداسیون لیپیدها و سپس خود لیپیدهای رادیکال



نمودار ۱۲. تأثیر غلظت‌های سالیسیک اسید بر غلظت مالون دی‌آکسید در سلول‌های گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژیرا، حروف الفبای بزرگ انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون هم‌انگاری معنی دار در سطح احتمال یک درصد



نمودار ۱۱. تأثیر غلظت‌های اسیدی آویشن بر غلظت مالون دی‌آکسید در سلول‌های گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژیرا، حروف الفبای بزرگ انگلیسی بیانگر معیار خطا در آزمون هم‌انگاری معنی دار در سطح احتمال یک درصد

مذکور به طور متوسط ۳ تا ۴ روز افزایش یابد. ترکیبات مذکور از طریق بهبود فعالیتهای آنتی‌اکسیدانی سلول‌های بافت گلبرگ‌ها، جلوگیری از تسریع مرگ سلول‌ها، حذف یا کاهش جمعیت میکروبیها در ظرف و محلول آب نگهداری گل‌ها، تأخیر در فرآیند لیگنیفیکاسیون در محل آسیب دیده بافت شاخه، کاهش پراکسیداسیون لیپیدی غشاء سلول‌ها از طریق کاهش تراکم رادیکال مولکول‌های آزاد در سلول‌های بافت و نهایتاً تقویت امکان حفظ پتانسیل آب سلولی در بافت گلبرگ‌ها و شاخه گل‌ها، طول عمر گل‌ها افزایش یابد.

### تشکر و قدرانی

از همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی برای تأمین و شناسایی جنس و گونه گیاه آویشن شیرازی سپاسگزاری می‌شود.

در این تحقیق نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف ترکیبات اسانس آویشن و سالیسیک اسید در طول مدت نگهداری گل‌ها تأثیر معنی‌دار بر غلظت آنتوسیانین در بافت گلبرگ گل‌های شاخه بریده ژیرا نداشت (جدول ۱). با این حال آنتوسیانین بعد از کلروفیل از مهمترین رنگیزه‌های غیر سمی و محلول در آب است و مسئول رنگدانه‌های فلاونوئیدی قرمز، آبی و بنفش در بسیاری از میوه‌ها، سبزیها و گل‌ها است که در هنگام تنش می‌تواند نقش نسبتاً مؤثری در دفاع گیاه از طریق جذب رادیکال‌های آزاد در سلول‌ها داشته باشد.

### نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج این تحقیق استفاده از ترکیبات اسانس آویشن شیرازی و سالیسیک اسید در محلول آب نگهداری گل‌های شاخه بریده ژیرا باعث شد طول عمر گل‌های

### منابع

- ۳- رخشنده رو، ف. بهمن یار، م. ۱۳۹۶. مرگ برنامه ریزی شده سلول در گیاهان. مجله تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی. جلد ۷ شماره ۲۶ صفحه ۸۰-۶۹.
- ۴- زندی، فیروزه. ۱۳۹۳. بررسی اثر نانو ذرات آلی و نانو ذرات فلزی بر ماندگاری گل شاخه بریده ژیرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

- ۱- ابراهیم‌زاده، ا. و سیفی، ی. ۱۳۷۵. انبارداری و جابجایی گل‌های شاخه بریده، گیاهان سبز زینتی و گیاهان گل‌دانی، انتشارات اختر، تهران، ۲۳۳ص.
- ۲- چاوشی، رقیه. ۱۳۹۳. بررسی اثر متقابل شاخه‌های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آنها در محلول گلجایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

- ۵- شور، م، خلیقی، ا، امید بیگی، ر، نادری، ر. ۱۳۸۲. اثرات اسید جیبرلیک ۶- بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر تولید اتیلن، باز شدن گلچه‌ها و ماندگاری در گلهای شاخه بریده مریم رقم دابل (*Polianthes tuberosa* L.). پایان‌نامه دوره دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۶- شاردن ترجمه عباسی، م. ۱۳۳۶. سیاحت‌نامه شاردن. تهران انتشارات امیرکبیر. جلد ۷.
- ۷- صفا، ذکبه. ۱۳۹۱، بهبود طول عمر گل شاخه بریده ژربرا به کمک نانو ذرات نقره و کلروفنول، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
- ۸- طالبی، س، مرتضوی، س، نادری، ر. ۱۳۹۲. بررسی فعالیت‌های آن‌تی اکسیدانت و میزان پروتئین گل رز شاخه بریده رقم سنسیرو. مجله علوم باغبانی. جلد ۴۴ شماره ۳ صفحه ۳۶۶-۳۵۹.
- ۹- علی پور، س، فرهمند، ه، نصیبی، ف. ۱۳۹۴. تأثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات موفولوژیکی، فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. جلد ۴ شماره ۱۴ صفحه ۱۱۴-۱۰۵.
- ۱۰- لاهوجی، ع، میرابوالفتحی، م، کرمی اسبو، ر. ۱۳۸۹. اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکول و داکسی نیوالنول و *Fusarium graminearum*. مجله بیماریهای گیاهی جلد ۴۶ شماره ۱ صفحه ۵۰-۳۷.
- ۱۱- محمدی، ز و س. مرتضوی. ۱۳۹۳. تأثیر ساکارز و سالیسیلیک‌اسید بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه potential in grape (*Vitis vinifera* L.) cell suspensions. Plant Cell Reports, 9:143-146.
- 21- Dole, J, m., and Wilkins, H. F. 1999. Floriculture and species. Prentice Hall Pub. Washington, USA.
- 22- Ezhilmathi, k., 2007. Physiological and biochemical studies of senescence in gladiolus. M.SC. Thesis. Indian Agricultural research Institute, New Delhi – 110012, India, 67P.
- 23- Heath, R.L., and Packer, L. 1968. Photo peroxidation in isolated chloroplasts. I., kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Arch. Biochem. Biophys. 125: 189-198.
- 24- Kader A.A. 2002. Post-harvest Technology of Horticulture Crops. University of California. Davis, CA, 504pp.
- بریده آلسترومریا (*Alstroemeria* cv. *Stratus*). نشریه علوم باغبانی جلد ۲۸ شماره ۴ صفحه ۵۱۶-۵۰۵.
- ۱۲- منصوری، م، م، شور، ع، تهرانی فر. ی، سلح ورزی. ۱۳۹۳. بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجادشده در اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تیمار بر گل ژربرا رقم پینک الگانس (*Gerbera jamesonii* L., cv. *Pink Elegance*). نشریه علوم باغبانی جلد ۲۹ شماره ۱ صفحه ۱۳۳-۱۲۷.
- ۱۳- میردهقان، س، س، زیدآبادی و ح. روستا. ۱۳۹۰. برهمکنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نترات نقره بر خصوصیات کیفی و طول عمر گل بریده رز. فصل‌نامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران جلد ۲۸، شماره ۴، صفحه ۶۸۳-۶۶۹.
- ۱۴- منصوری، م، م، شور، ع، تهرانی فر. ی، سلح ورزی. ۱۳۹۳. بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجادشده در اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تیمار بر گل ژربرا رقم پینک الگانس (*Gerbera jamesonii* L., cv. *Pink Elegance*). نشریه علوم باغبانی جلد ۲۹ شماره ۱ صفحه ۱۳۳-۱۲۷.
- ۱۵- نظری دلجو، م، م، عرب، ر، کرمان، ح، جابریان همدان. ۱۳۹۳. تأثیر تیمار پس از برداشت سالیسیلیک‌اسید بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیاپاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده ژربرا. مجله علوم باغبانی ایران دوره ۴۶ شماره ۲ صفحه ۲۷۳ - ۲۳۹.

- 25- Knee, M.2000, Selection of biocides for use in floral preservatives. *Postharvest Biol. and Technol.*18:227-224.
- 26- Parham, M. J. and Kessrling, K., 1985. Rosmarinic Acid. *Drug Future*. Vol. 10. PP.756-757.
- 27- Pirasteh-Anosheh H, Ranjbar G, Emam Y, Ashraf M. 2014. Salicylic acid-induced recovery ability in salt-stressed *Hardeum vulgare* plant. *Turk J Bot.* 37: 112-121.
- 28- Rajasekaran L. R., Stiles A., and Caldwell C. 2002. Stand establishment in processing carrots: Effects of various temperature regimes on germination and the role of salicylates in promoting germination at low temperature. *Journal of plant Science*, 82: 443-450.
- 29- Ruley, A. T., Sharma, N. C., and Sahi, S. (2004). Antioxidant defense in a lead accumulating plant, *Sesbania drummondii*. *Plant Physiology and Biochemistry*, 42:899-906. doi:10.1016/j.plaphy.2004.12.001
- 30- Solgi, M., Kafi M 2009. Essential oil and silver nanoparticle as a novel agent to extend vase life of gerbera (*Gerbera Jamesonii* cv. Dune) flowers. *Postharvest Biology and Technology*. 53: 155-158.
- 31- Sun, T. P and F. Gubler. 2004. Molecular mechanism of gibberellin signaling in plants. *Ann. Rev. plant Biol.*55:197-223.
- 32- Van Doorn, w. G.2001 a. categories of petal senescence and abscission: re-evaluation. *Ann.Bot.*87: 447-456.
- 33- Zhan, L. J., Fontana, E., Tibaldi, G., and Nicola, S. 2009. Qualitative and physiological response of minimally processed garden cress (*Lepidium sativum* L.) to harvest handling and storage conditions. *Journal of Food, Agriculture and Environment*, Vol.7 (3and4): 43 - 50.

## Lifespan of cut flowers of gerbera under thyme essence and salicylic acid effects

Ghalamboran M.R., Abdollahi M. and Bernard F.C.

Dept. of Plant Sciences and Biotechnology, School of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, I.R. of Iran

### Abstract

The beauty of the gerbera flower depends on the lifespan of its petals. The lifespan of the petals depends on preserving the relative water content and the metabolic activity of the petals cells. The flower producers use compounds that protect and enhance the metabolism of the cells, as well as prevent the invasion of bacterial pathogens and the ability to maintain the water's potential for petals tissues. The present study was conducted to determine the lifespan and metabolic activities of the petals tissues under thyme essence and salicylic acid effects. Treatments were different concentrations of thyme essence (0, 150, 300, 600  $\mu\text{L L}^{-1}$ ) and salicylic acid (0, 500, 1000, 2000  $\mu\text{M L}^{-1}$ ) and their simultaneous use in aqueous medium. The treatments were sorted in the factorial experiment (4×4) on a randomized complete block design with three replications in laboratory conditions. The variables were lifespan, relative water content, activity of enzymes (phenylalanine ammonia lyase, peroxidase and catalase), malondialdehyde content and anthocyanin content in the petals cells. The most important results showed that 600  $\mu\text{L L}^{-1}$  of thyme essence in the container of the cut flowers due to its antioxidant and antibacterial properties, increased the lifespan of the flowers compared with the control for 4 days. Also, 2000  $\mu\text{M L}^{-1}$  of salicylic acid due to the improved ability of the tissue defense system of the petals via arising of the resistance to oxidative stress of cells increased the life span of the cut flowers from 4 days to 8 days.

**Key words:** Lifespan; gerbera; salicylic acid; thyme essence